COMITÉ NATIONAL DE L'ENFANCE
51, avenue Victor-Emmanuel-III. — Paris (VIIIe).

ÉTUDE GÉNÉRALE
DE LA
MORTALITÉ DE L'ENFANT
de première année

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences. — Prix Montyon, 1937.

LIVRE X

FRANCE ENTIÈRE

PAR

le Docteur LESAGE,
Membre de l'Académie de Médecine,
Directeur
du Comité national de l'Enfance.

Marcel MOINE,
Statisticien,
Lauréat de l'Académie de Médecine.

MELUN
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE
—
1938

17924-3
F 10 D 7

COMITÉ NATIONAL DE L'ENFANCE
31, avenue Victor-Emmanuel-III — Paris (VIIIe)

ÉTUDE GÉNÉRALE
DE LA
MORTALITÉ DE L'ENFANT
de première année

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Médiathèque Gabriel Tarde

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences. — Prix Montyon, 1937.

LIVRE X

FRANCE ENTIÈRE

PAR

le Docteur LESAGE,
Membre de l'Académie de Médecine,
Directeur
du Comité national de l'Enfance.

Marcel MOINE,
Statisticien,
Lauréat de l'Académie de Médecine.

MELUN
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE
1938

INTRODUCTION

Le but de la présente étude est de mettre à jour, autant que les statistiques officielles actuellement publiées nous le permettent, l'abondante documentation que nous avions jusqu'alors réunie — Livres I à IX — sur la mortalité générale de l'enfant de première année et qui se trouvait arrêtée à 1929.

Selon le plan généralement adopté, on trouvera aux prochains chapitres, traduites à l'aide de tableaux objectivement présentés, toutes les données statistiques relatives non seulement à l'évolution de la mortalité infantile de 1930 à 1936, mais encore à l'angoissant problème de la dénatalité.

Enfin, à côté de cette actualité, nous avons tenu à placer quelques renseignements rétrospectifs, afin d'établir, pour chacun de nos départements et en toute impartialité, une comparaison utile et suggestive. L'évolution de la mortalité infantile depuis 1861, de la mortalité néonatale par sexe (décès de 0 à 30 jours) de 1901-1905 à 1933-1935 retiendront plus particulièrement l'attention de nos lecteurs.

DÉMOGRAPHIE

Le tableau I fournit, pour chacun de nos départements, la population française et étrangère qui y était domiciliée lors des recensements de 1931 et de 1936. Au cours de ces cinq années, nous notons un accroissement du nombre des habitants dans les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Inférieure, la Corse, la Côte-d'Or, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, le Bas-Rhin, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine, la Seine-Inférieure, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Oise, la Somme, le Var, le Vaucluse, la Vienne.

Si, pour certains de ces départements, cette augmentation se justifie et au-delà par un apport d'étrangers, pour d'autres, au contraire, et ce sont les plus nombreux, il semble qu'il s'agisse d'un accroissement de la population autochtone. (1). Peut-on voir dans ce fait un prélude « au retour à la terre », puisque, en dehors des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Inférieure et de la région parisienne, le caractère rural de ces départements est indéniable ? Cette opinion n'est pas invraisemblable étant donné, nous allons le voir au prochain chapitre, que les taux de natalité n'assurent pas toujours un potentiel démographique positif. Quoi qu'il en soit, cette évolution devait être signalée, de même que celle de la population étrangère dont l'examen rappellera la présence de fortes colonies dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, en même temps qu'il donnera une idée de l'immigration récente enregistrée par certains autres. A cet égard, nous citerons plus particulièrement la Charente, la Corrèze, la Corse, la Creuse, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne, cependant que pour l'ensemble du pays l'effectif étranger est passé de 2.890.923 à 2.453.507, soit une diminution de 15, 1 %.

Telles sont les caractéristiques essentielles qu'il était indispensable de mettre en évidence puisqu'au aussi bien elles peuvent influer en partie sur les données des prochains chapitres.

(1) Il convient aussi de ne pas oublier les nombreuses et récentes naturalisations qui ont pu affecter plus spécialement certaines régions.

TABLEAU I. — Population recensée en 1931 et en 1936.

(Population domiciliée.)

DEPARTEMENTS	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN : 1931	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN : 1936	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km²) R. 1936	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1931	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1936	Sur 100 habitants au total combien d'étrangers en 1936 ?
Ain	322.918	316.710	54.3	20.293	15.000	4.7
Aisne	489.368	484.647	65.3	40.885	35.110	7.2
Allier	373.924	368.778	50.1	11.313	8.315	2.3
Alpes (Basses-)	87.893	85.090	12.2	7.324	6.673	7.8
Alpes (Hautes-)	87.566	88.210	15.6	4.171	4.040	4.6
Alpes-Maritimes	493.376	513.714	137 »	140.446	113.604	22 »
Ardèche	282.911	272.698	49.2	7.224	4.499	1.6
Ardennes	293.265	288.632	55 »	30.762	23.698	8.2
Ariège	161.265	155.134	31.7	8.200	6.782	4.4
Aube	242.596	239.563	39.8	13.654	13.114	5.5
Aude	296.880	285.115	45 »	40.330	36.397	12.8
Aveyron	323.782	314.682	35.9	13.190	9.618	3.1
Belfort (Territoire de)	99.403	99.497	163 »	9.509	6.380	6.4
Bouches-du-Rhône)	1.101.672	1.224.802	232 »	248.800	245.375	20.1
Calvados	401.356	404.901	71.3	15.252	12.678	3.1
Cantal	193.505	190.888	33.1	2.273	2.674	1.4
Charente	310 489	309 279	51.7	2.853	3.862	1.3
Charente-Inférieure	415.249	419.021	58 »	4.592	3.670	0.9
Cher	293.918	288.695	39.7	6.198	5.919	2.1
Corrèze	264 129	262.770	44.7	1.398	2.716	1 »
Corse	297.235	322.854	37 »	10.217	19 848	6 »
Côtes-d'Or	333.800	334.386	38 »	13.904	14.070	4.2
Côtes-du-Nord	539.531	531.840	73.7	1.365	1.504	0.3
Creuse	207.882	201.844	36 »	2.275	3.202	1.6
Dordogne	383.720	386.963	41 9	5.753	9.880	2.6
Doubs	305.500	304.812	57.8	26.068	21.118	6.9
Drôme	267.080	267.281	40.7	7.795	7.635	2.9
Eure	305.788	303.829	50.4	11.581	10.557	3.5
Eure-et-Loir	254.790	252.690	42.6	.3.864	3.619	1.4
Finistère	744.295	756.793	108 »	1.188	1.149	0.2
Gard	406.815	395.299	67.1	32.166	28.742	7.3
Garonne (Haute-)	441.799	458.647	72.1	30.936	37.392	8.1

TABLAU I. — Population recensée en 1931 et 1936 (suite).

(Population domiciliée.)

DEPARTEMENTS	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN : 1931	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN : 1936	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km²) R. 1936	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1931	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1936	Sur 100 habitants au total combien d'étrangers en 1936
Gers	193.134	192.451	30.5	15.974	20 805	10.8
Gironde	852.768	850 567	79.6	35.946	33.090	4.1
Hérault	514.819	502.043	80.7	70.819	53.423	10.6
Ille-et-Vilaine	562.558	565.766	81.3	3.607	2.692	0.5
Indre	247.912	245.622	35 6	1.957	2.935	1.2
Indre-et-Loire	335.226	343.276	55.6	5.343	5.676	1.7
Isère	584.017	572.742	68.8	70.680	59.561	10.4
Jura	229.109	220.797	43 7	11.235	7.595	3.4
Landes	257.186	251.436	26.8	3.750	3.722	1.5
Loir-et-Cher	241.592	240.908	37.6	2.913	3.035	1.3
Loire	664.822	650.226	135 »	38.953	31.121	4.8
Loire (Haute-)	251.608	245.271	49.1	2.061	1,806	0.7
Loire-Inférieure	652 079	659.428	94.3	6.198	5 432	0.8
Loiret	342.679	343.865	50.4	9.649	9.352	2.7
Lot	166.637	162.572	31.1	2.749	3 931	2.4
Lot-et-Garonne	247.500	252.764	47.1	22.246	29.[illegible]56	11.9
Lozère	101.849	98 480	18.9	438	455	0 5
Maine-et-Loire	475.991	477,690	66.3	3.463	3.253	0.7
Manche	433.473	438.536	68.3	3.958	2.868	0.7
Marne	412.156	410.238	49.9	22.213	16.641	4.1
Marne (Haute-)	189.791	188.471	30 »	8.688	7.418	3 9
Mayenne	254.479	251.348	48.2	856	898	0.4
Meurthe et-Moselle	592.632	576.041	109 »	99.533	67.373	11.8
Meuse	215.819	216.934	34.8	16.009	13.195	6.1
Morbihan	537 528	542.248	76.5	1.056	1.028	0.2
Moselle	693.408	696.246	112 »	130.095	91.101	13 1
Nièvre	255.195	249.673	36 3	7.209	5.760	2.3
Nord	2.029.449	2.022.167	350 »	222.247	171.343	8.5
Oise	407.432	402.569	68.5	33.284	29.960	7.4
Orne	273.717	269.331	43.8	4.064	3.415	1.3
Pas-de-Calais	1.205.191	1.179.467	175 »	173.525	135 885	11.5
Puy-de-Dôme	500.590	486.103	60.7	11.732	12.593	2 6

TABLEAU I (suite). — *Population recensée en 1931 et 1936.*

(Population domiciliée.)

DÉPARTEMENTS	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN 1931	POPULATION TOTALE RECENSÉE EN 1936	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km²) R. 1936	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1931	POPULATION ÉTRANGÈRE RECENSÉE EN : 1936	Sur 100 habitants au total combien d'étrangers en 1936 ?
Pyrénées (Basses-)	422.519	413.411	53.7	27.524	18.465	4.5
Pyrénées (Hautes-)	189.993	188.604	41.7	11.835	10.488	5.6
Pyrénées-Orientales	238.647	233.347	56.3	37.339	42.649	18.3
Rhin (Bas-)	688.242	711.830	149 »	21.507	18.423	2.6
Rhin (Haut-)	516.726	507.551	145 »	37.526	23.066	4 5
Rhône	1.046.028	1.028.379	360 »	73.243	63.141	6.1
Saône (Haute-)	219.257	212.829	39.6	7.668	6.157	2.9
Saône-et-Loire	538.741	525.676	60.8	23.060	19.166	3.7
Sarthe	384.619	388.519	62.3	2.043	1.704	0.4
Savoie	235.544	239.010	38.6	21.925	20.680	8.7
Savoie (Haute-)	252.794	259.961	56.5	23.294	22.264	8.6
Seine	4.933.855	4.962.967	10.350 »	459.498	369.317	7.4
Seine-Inférieure	905.278	915.628	145 »	21.939	15.355	1.7
Seine-et-Marne	406.108	409.311	69 »	36.121	32.203	7.9
Seine-et-Oise	1.365.616	1.412.384	249 »	122.447	92.462	6.6
Sèvres (Deux-)	308.481	308.841	51 1	2.146	1.867	0.6
Somme	466.626	467.479	74.3	18.349	17.503	3.7
Tarn	302.994	297.871	51.6	17.877	17.780	6.0
Tarn-et-Garonne	164.259	164.629	44.2	10.652	13.947	8.4
Var	377.104	398.662	66.1	52.949	46.534	11.7
Vaucluse	241.689	245.508	68.8	18.222	16.344	6.6
Vendée	390.396	389.211	55.3	1.616	1.116	0.3
Vienne	303.072	306.820	43.7	2.105	3.516	1.2
Vienne (Haute-)	335.873	333.589	60.0	2.064	3.634	1.1
Vosges	377.980	376.926	63.8	8 .577	7.523	2.0
Yonne	275.755	271.685	36.5	11.168	10.062	3.7
FRANCE ENTIÈRE	*41.834.923*	*41.905.968*	*76.0*	*2.890.923*	*2.453.507*	*5.9*

CHAPITRE I

NATALITÉ

Cette question vitale est traitée dans le tableau I qui fournit, avec les nombres absolus de naissances vivantes, la proportion pour 1.000 habitants de tout âge, pour chaque département et pour chacune des sept années de la période 1930-1936. La comparaison des taux établis pour la France entière est assez suggestive pour se passer de nombreux commentaires.

En 1930, 17, 9 naissances vivantes pour 1.000 habitants. En 1936, 15, 0 naissances vivantes pour 1.000 habitants. C'est dire qu'en 7 ans, la natalité française a subi un déclin de 16, 2 pour 100.

S'il ne nous est pas permis d'insister ici, comme nous l'avions fait pour 1926 dans les précédents volumes, sur le degré de fertilité de chacun de nos départements — le recensement de 1936 n'ayant pas encore été publié quant à la composition par âge, par sexe et par état civil des populations — nous avons tenu cependant, dans le tableau II, à fixer l'attention des lecteurs. En effet, nous y avons opposé l'évolution des taux de natalité de 1901-1905 à 1925-1929, d'une part, soit *25 ans*, à celle plus récente, mais combien plus sensible enregistrée de 1925-1929 à 1936, soit une *dizaine d'années*. Pour 52 de nos départements, le déclin a été plus important en 10 ans qu'en 25 ans. Citons, parmi les plus touchés, l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse, le Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, les Landes, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Oise, le Tarn, le Var, la Haute-Vienne, l'Yonne, qui, tous, accusent, en outre, pour 1936, un taux de natalité inférieur à la moyenne. Enfin, ajoutons que le département des Bouches-du-Rhône a aujourd'hui la natalité la plus faible, avec 10,2 naissances vivantes pour 1.000 habitants, tandis que le département de la Manche prend au Pas-de-Calais la première place avec 21,3 naissances.

Tableau I. — Natalité enregistrée de 1930 à 1936. — Naissances vivantes et proportion pour 1.000 habitants.

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀
Ain	5.479	17,0	5.179	16 0	5.257	16,3	4.840	15,0	4.602	14,6	4.507	14,2	4.365	13,8
Aisne	10.501	21,5	10.383	21,3	9.925	20,3	9.178	18,8	9.146	18,9	8 692	17,9	8 334	17,2
Allier	5.434	14,5	5.515	14,7	5.289	14,1	5.041	13,5	4.947	13,4	4.860	13,2	4.664	12,6
Alpes (Basses-)	1.352	15,4	1.260	14,3	1.204	13,7	1.142	13,0	1.044	12,2	1 072	12,6	1.033	12,1
Alpes (Hautes-)	1.530	17,5	1.500	17,1	1.563	17,8	1.454	16,6	1.488	16,9	1 365	15,5	1.407	16,0
Alpes-Maritimes	6.818	13,8	6.876	13,9	6·635	13,4	6.186	12,5	6.129	12,0	5.741	11,2	5.657	11,0
Ardèche	4.944	17,5	4.754	16,8	4.664	16,5	4.487	15,9	4.372	16,0	4.121	15,1	4.051	14,8
Ardennes	6.014	20,5	5.992	20,4	5.823	19,8	5.330	18,1	5.588	19,3	5.238	18,1	5.075	17,6
Ariège	2.401	14,9	2.134	13,2	2.106	13,1	1.921	11,9	1.930	12,4	1.806	11,6	1.818	11,7
Aube	4.517	18,6	4 323	17,8	4.194	17,3	4.027	16,6	4.199	17,5	3.951	16,5	3.824	16,0
Aude	4.793	16,1	4.538	15,3	4.633	15,6	4.285	14,4	4.182	14,7	3.967	13,9	3.524	12,4
Aveyron	5.787	18,1	5.677	17,5	5.616	17,3	5.154	15,9	5.279	16,8	4.998	15,9	4.953	15,7
Belfort (territoire de)	2 033	20,4	1.938	19,5	1.901	19,1	1.778	17,9	1.782	17,9	1.697	17,1	1.616	16,2
Bouches-du-Rhône	15.106	13,7	14.670	13,3	14.787	13,4	13.968	12,7	13.623	11,1	12.718	10,4	12.503	10,2
Calvados	8.909	22,2	8.821	22,0	8.591	21,4	8.151	20,3	8.413	20,8	7.849	19,4	7.714	19,1
Cantal	3.580	18,5	3.510	18,1	3.558	18,4	3.461	17,9	3,339	17,5	3.179	16,7	3.063	16,0
Charente	5.432	17,5	5.230	16,8	5.331	17,2	5.092	16,4	5.174	16,8	4.897	15,8	4.814	15,6
Charente-Inférieure	7.545	18,2	7.430	17,9	7.458	18,0	7.091	17,1	6.940	16,6	6.704	16,0	6.507	15,5
Cher	4.283	14,6	4.245	14,4	4.141	14,1	3.945	13,4	3.854	13,3	3.757	13,0	3.785	13,1
Corrèze	4.181	15,8	4.043	15,3	3.975	15,0	3.810	14,4	3.808	14,5	3.604	13,7	3.441	13,1
Corse	3.840	12,9	3.766	12,7	3.709	12,5	3.670	12,3	3.576	11,1	3.575	11,1	3.424	10,6
Côte-d'Or	5.718	17,1	5.561	16,5	5.576	16,5	5.467	16,2	5.297	15,9	5.091	15,2	5 169	15,5
Côtes-du-Nord	11.406	21,1	11.074	20,5	11.204	20,8	10.445	19,4	10.349	19,4	9.716	18,3	9.721	18,2
Creuse	3.022	14,5	2.842	13,7	2.844	13,7	2.697	13,0	2.762	13,7	2.476	12,3	2.467	12,2
Dordogne	6.546	17,1	6.543	17,0	6.466	16,8	5.928	15,4	5.969	15,4	5.730	14,8	5.506	14,2
Doubs	6.212	20,3	6.119	20,0	5.863	19,2	5.604	18,3	5.576	18,3	5.299	17,4	5.256	17,2
Drôme	4.190	15,7	4.004	15,0	3.901	14,6	3.783	14,2	3.735	14,0	3.676	13,8	3.478	13,0
Eure	6.125	20,0	6.112	19,9	5.919	19,4	5.703	18,7	5.725	18,9	5.454	17,9	5.260	17,3
Eure-et-Loir	4.896	19,2	4.814	18,9	4.707	18,5	4.437	17,4	4.648	18,4	4.380	17,3	4.178	16,6
Finistère	15.204	20,4	14.981	20,2	15.226	20,5	14.121	19,0	14.384	19,0	13.897	18,4	13.671	18,1
Gard	6.105	15,0	5.909	14,5	5.770	14,2	5.314	13,1	5.260	13,3	5.019	12,7	4.913	12,4
Garonne (Haute-)	6.682	15,1	6.518	14,8	6.577	14,9	6.203	14,0	6.440	14,0	6.140	13,4	6.038	13,2

Tableau 1 (suite). — *Natalité enregistrée de 1930 à 1936.* — Naissances vivantes et proportion pour 1.000 habitants.

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo	Naissances vivantes.	°/oo
Gers	2838	14,7	2.823	14,6	2.941	15,2	2.836	14,7	2.674	13,9	2.565	13,3	2.684	13,8
Gironde	13.321	15,6	12.518	14,7	12.885	15,1	12.025	14.1	11.919	14,0	11.269	13,2	4.030	13,0
Hérault	7.786	15,1	7.458	14,5	7.229	14,0	6.840	13,3	6.760	13,5	6.237	12,4	5.913	11,8
Ille-et-Vilaine	12.024	21,4	11.623	20,7	11.866	21,1	11.113	19,8	11.150	19,8	10.327	18,3	10.487	18,5
Indre	4.140	16,7	3.944	15,9	3.879	15,6	3.597	14,5	3.744	15,2	3.668	14,9	3.463	14,1
Indre-et-Loire	5 914	17,6	5.769	17,2	5 990	17,9	5.636	16,8	5.824	17,0	5.597	16,3	5.520	16,1
Isère	9.770	16,7	9.567	16,4	9.008	15,4	8.617	14,8	8.397	14,6	7 866	13,7	7.940	13,9
Jura	4.265	18,6	4.082	17,8	3.926	17,1	3.673	16,0	3.512	15,9	3.386	15,3	3.360	15,2
Landes	4.152	16,1	3.893	15,1	3.970	15,4	3.575	13,9	3.547	14,2	3.398	13,5	3.362	13,3
Loir-et-Cher	4 303	17,8	4.217	17,5	4.256	17,6	4.064	16,8	4.110	17,1	3.859	16,0	3.887	16,2
Loire	11.170	16,8	10.841	16,3	10.357	15,6	9.945	15,0	9.720	15,0	9.214	14,2	9.198	14,1
Loire (Haute-)	4.352	17,3	4.233	16,8	4.165	16,6	4.057	16,1	3.990	16,3	3.818	15,6	3.712	15,1
Loire-Inférieure	12.004	18,4	11.814	18,1	11.924	18,3	11.352	17.4	11.202	17,0	10 573	16,0	10.838	16,4
Loiret	5.898	17,2	5.673	16,6	5.738	16,7	5.423	15,8	5.606	16,3	5.250	15,3	5.232	15,2
Lot	2.432	14,6	2 415	14,5	2 365	14,2	2.229	13,4	2.170	13,3	2.116	13,0	2.158	13,3
Lot-et-Garonne	3.807	15,4	3.669	14,8	3.878	15,7	3.639	14,7	3.666	14,5	3.548	14,0	3.542	14,0
Lozère	1.794	17,6	1.656	16,3	1.730	17,0	1.572	15,4	1.653	16,8	1.496	15,2	1.521	15,4
Maine-et-Loire	8.825	18,5	8.717	18,3	8.982	18,9	8.536	17,9	8.613	18,0	8.349	17,5	8.176	17,1
Manche	9.962	23,0	9.880	22,8	9.901	22,8	9.311	21,5	9.633	21,9	9.103	20,8	9.346	21,3
Marne	8.192	19,9	8.042	19,5	7.747	18,8	7.466	18,1	7.660	18,7	7.254	17,7	7.084	17,3
Marne (Haute-)	3.732	19,7	3.677	19,4	3.465	18,3	3.354	17,7	3.398	18,1	3 203	17«0	3.266	17.3
Mayenne	5.484	21,5	5.352	21,0	5.571	21,9	5.332	21,0	5.133	20,4	4.966	19,8	4.840	19,2
Meurthe-et-Moselle	13.147	22,2	12.964	20,4	12.705	21,4	11.453	19,3	11.458	19'9	10.456	18,1	10.379	18,0
Meuse	4.346	20,1	4.328	20,1	4.246	19,7	3.967	18,4	3.926	18,1	3.926	18.1	3.692	17,0
Morbihan	11.881	22,1	11.826	22,0	11.964	22,3	11.622	21,6	11.632	21,4	10.694	19,7	10.817	19,9
Moselle	15.110	21,8	14.820	21,4	14.343	20,7	13.555	19,5	13.363	19,2	12.669	18,2	12.929	18,5
Nièvre	3.875	15,2	3.778	14,8	3.701	14,5	3.447	13,5	3.473	13,9	3.340	13,4	3.251	13,0
Nord	41.658	20,5	40.856	20,1	39.109	19,3	35.741	17,6	35.895	17,8	33.220	16,4	32.625	16,1
Oise	8.061	19,8	8.008	19,7	7.884	19,3	7.388	18,1	7.536	18,7	6.948	17,3	6.767	16,8
Orne	5.583	20,4	5.451	19,9	5.411	19,8	5.170	18,9	5.424	20,1	4.908	18,2	4.789	17,8
Pas-de-Calais	29.565	24,5	29.845	24,8	27.982	23,2	25.605	21,2	25.601	21,7	23.418	19,8	23.140	19,6
Puy-de-Dôme	7.795	15,6	7.245	14,5	7.097	14,2	6.852	13,7	6.835	14,1	6.428	13,2	6.122	12,6

Tableau I (suite). — *Natalité enregistrée de 1930 à 1936.* — Naissances vivantes et proportion pour 1.000 habitants.

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀	Naissances vivantes.	°/₀₀
Pyrénées (Basses-)	7.667	18,1	7.605	18,0	7.484	17,7	6.628	15,7	6.870	16,7	6.424	15,5	6.496	15,7
Pyrénées (Hautes-)	3.081	16,2	3.037	16,0	2.846	15,0	2.784	14,7	2.783	14,7	2.698	14,3	2.577	13.7
Pyrénées-Orientales	3.268	13,7	3.215	13,5	3.237	13,6	3.036	12,7	2.866	12,3	2.803	12,0	2.735	11,7
Rhin (Bas-)	13.337	19.4	13.145	19,1	13.040	18,9	12.421	16,3	12.635	17,7	12.049	16,9	11.642	16,3
Rhin (Haut-)	9.863	19,1	9.709	18,8	9 250	17,9	8.075	15.6	8.597	16,9	7.722	15,2	7.789	15,3
Rhône	17.060	16,3	16.037	15,3	15.171	14,5	14.314	13,7	14.072	13,7	13.313	12,9	12.799	12,4
Saône (Haute-)	4 026	18,4	3.820	17,4	3.857	17,6	3.537	16,1	3.568	16,8	3 489	16,4	3 516	16,5
Saône-et-Loire	9 291	17,2	9.058	16,8	8,698	16,1	8.238	15,3	8.256	15,7	7.748	14,7	7.542	14,3
Sarthe	8.081	21,0	7.723	20,1	7.903	20,5	7,577	19,7	7.796	20,1	7.595	19 5	7.373	19,0
Savoie	4.298	18,2	4.179	17,7	4.315	18,3	4.034	17,1	3.960	16,6	3.774	15,8	3.805	15,9
Savoie (Haute-)	4.374	17,3	4.360	17,2	4.497	17.8	4.260	16,9	4.257	16,4	4.185	16,1	4.102	15,8
Seine	78 189	15.8	76.791	15,6	74.275	15,1	69.572	14,1	67.983	13,7	63.594	12,8	62.049	12,5
Seine-Intérieure	19.523	21,6	19.104	21,1	18.843	20,8	17.722	19,6	18.018	19,6	17.035	18,6	17.020	18,6
Seine-et-Marne	7.092	17,5	7.091	17,5	6.795	16,7	6.477	15.9	6.372	15,6	5.837	14,3	5.847	14,3
Seine-et-Oise	20.230	14,8	20.277	14,8	19.989	14,6	18 800	13,8	18.048	12,8	17.359	12,3	17.010	12,0
Sèvres (Deux-)	5.930	19,2	5.798	18.8	5.918	19,4	56.40	18,3	5.814	18,8	5.645	18,	5.455	17,7
Somme	9,245	19,8	8.996	19,3	8.839	18,9	8.293	17,8	8.467	18,1	8.148	17,4	7.846	16,8
Tarn	4 841	16,0	4.877	16,1	4 897	16,2	4.509	14,9	4.345	14,6	4.085	13,7	4.029	13,5
Tarn-et-Garonne	2.527	15,4	2.666	16,2	2.740	16,7	2.484	15,1	2,578	15,6	2.308	14,0	2.351	14,3
Var	5.111	13,6	5.118	13,6	5.350	14,2	5.175	13,7	5.358	13,4	5.008	12,6	5.052	12,7
Vaucluse	3.989	16,5	3.880	16,1	3.856	16,0	3.838	15.9	3.738	15,2	3 644	14,8	3.589	14,6
Vendée	8.207	20,8	8.102	20,7	8.108	20,8	7.881	20,2	7.808	20,1	7.758	19,9	7.588	19.5
Vienne	5.426	17,9	5.215	17,3	5.386	17,8	5.078	16,8	5.177	16,9	5.007	16,3	4.951	16.1
Vienne (Haute-)	5.513	16,4	5.352	15,9	5.157	15,4	4.927	14,7	4,961	14,8	4.637	13,9	4.308	12,9
Vosges	7.685	20,3	7.280	19,3	7.198	19,0	6.758	17,9	6.846	18,2	6.729	17,9	6.558	17,4
Yonne	4.328	15,7	4.229	15,3	4.094	14.8	3.937	14,3	3.921	14,4	3.688	13,6	3.761	13,8
FRANCE ENTIÈRE	*749.953*	*17,9*	*733.909*	*17,5*	*722.371*	*17,3*	*678 700*	*16,2*	*677.878*	*16,2*	*640.527*	*15,3*	*630.059*	*15,0*

TABLEAU II. — Diminution du taux de la natalité depuis 1901 :
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DEPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936.
Ain	19,8	17,4	13,8	12,1	20,7
Aisne	22,0	22,0	17,2	—	21,8
Allier	18,0	14,8	12,6	17,8	14.9
Alpes (Basses-)	20,3	15,6	12,1	23,1	22,4
Alpes (Hautes-)	22,8	18,4	16,0	19,3	13,1
Alpes-Maritimes	21,7	16,2	11,0	25,3	32,1
Ardèche	23,2	18,4	14,8	20,7	19,6
Ardennes	20,4	20,2	17,6	1,0	12,9
Ariège	18,1	13,6	11,7	24,8	14,0
Aube	18,0	18,5	16,0	+ 2,7	13,5
Aude	19,1	15,9	12,4	16,7	22,0
Aveyron	24,8	18,2	15,7	26,6	13,7
Belfort (Territoire de)	24,0	19,7	16,2	17,9	17,8
Bouches-du-Rhône	22,1	16,8	10,2	24,0	39,3
Calvados	20,5	22,2	19,1	+ 8,3	14,0
Cantal	21,6	18,4	16,0	14,8	13,1
Charente	18,8	17,2	15,6	8,5	9,3
Charente-Inférieure	18,2	17,7	15,5	2,7	12,4
Cher	18,7	15,0	13,1	19,8	12,7
Corrèze	22,5	16,3	13,1	27,6	19,6
Corse	22,5	14,7	10,6	34,7	27,9
Côte-d'Or	17,0	17,2	15,5	+ 1,2	9,9
Côtes-du-Nord	26,9	22,2	18,2	17,4	18,0
Creuse	18,4	14,4	12,2	21,7	15,3
Dordogne	20,6	17,0	14,2	17,5	16,5
Doubs	23,1	21,2	17,2	8,3	18,9
Drôme	18,9	16,2	13,0	14,3	19,7
Eure	19,6	20,4	17,3	+ 4,1	15,2
Eure-et-Loir	20,1	19,5	16,5	3,0	15,4
Finistère	31,2	21,3	18,1	31,7	15,0
Gard	20,0	15,3	12,4	23,5	18,9
Garonne (Haute-)	16,3	15,3	13,2	6,1	13,7

TABLEAU II (suite). — *Diminution du taux de la natalité depuis 1901*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DÉPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936
Gers	14,1	14,9	13,8	+ 5,6	7,4
Gironde	17,2	16,3	13,0	5,2	20,2
Hérault	19,8	15,3	11,8	22,7	22,9
Ille-et-Vilaine	22,9	21,5	18,5	6,1	14,0
Indre	20,0	16,4	14,1	18,0	14,0
Indre-et-Loire	17,5	17,6	16,1	+ 0,6	8,5
Isère	18,9	17,0	13,9	10,0	18,2
Jura	21,3	18,8	15,2	11.7	19,1
Landes	21 4	16,3	13,3	23,8	18,4
Loir-et-Cher	19,2	17,6	16,2	8,3	8,0
Loire	21,6	17,1	14,1	20,8	17,5
Loire (Haute-)	23,0	17,4	15.1	24,3	13,2
Loire-Inférieure	20,8	18.8	16,4	8,7	12,8
Loiret	19.0	17,2	15,2	9,5	11.6
Lot	15.9	14,1	13,3	11,3	5,7
Lot-et-Garonne	15,6	15,5	14,0	6,4	9,7
Lozère	25,3	17,7	15,4	30,0	13,0
Maine-et-Loire	17,8	18,5	17,1	+ 4,0	7,6
Manche	21,4	22,3	21,3	+ 4,2	4,5
Marne	21,5	20,5	17,3	4,7	15,6
Marne (Haute-)	18,1	18,9	17,3	+ 4,4	8,5
Mayenne	21,4	21,3	19.2	0,5	9,9
Meurthe-et-Moselle	23,5	23,4	18,0	0,4	23.0
Meuse	18,9	21,0	17,0	+ 11,1	19,1
Morbihan	27,5	23,0	19,9	16,3	13,5
Moselle	»	23,7	18,5	»	21,9
Nièvre	17,3	14.7	13,0	15,0	11,5
Nord	26,0	23.5	16,1	21,1	21,5
Oise	21,3	20,2	16,8	5,2	16,8
Orne	17,2	20,2	17,8	+ 17,4	11.9
Pas-de-Calais	30,6	25,4	19,6	17,6	22,8
Puy-de-Dôme	17,2	15,5	12,6	9,9	18,7

TABLEAU II (suite). — *Diminution du taux de la natalité depuis 1901*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DÉPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936
Pyrénées (Basses-)	22,7	17,6	15,7	22,4	10,8
Pyrénées (Hautes-)	17,3	16,2	13,7	6,4	15,4
Pyrénées-Orientales	22,8	14,7	11,7	35,5	20,4
Rhin (Bas-)	»	20,4	16,3	»	20,1
Rhin (Haut-)	»	19,6	15,3	»	21,9
Rhône	18,6	16,1	12.4	12,9	23,5
Saône (Haute-)	23,6	18,2	16,5	22,9	9,3
Saône-et-Loire	21,3	17,4	14,3	18,3	17,8
Sarthe	19,9	20,4	19,0	+ 2,5	6,9
Savoie	22,2	19,4	15,9	12,6	18,0
Savoie (Haute-)	22,6	19,0	15,8	15,9	16,8
Seine	20,4	16,3	12,5	20,1	23,3
Seine-Inférieure	26,9	21.7	18,6	19,3	14,3
Seine-et-Marne	19,5	17,6	14,3	9,8	18,7
Seine-et-Oise	20,3	16,0	12,0	21,2	25,0
Sèvres (Deux-)	19,7	18,7	17,7	5,1	5,4
Somme	20,8	19,9	16,8	4,3	15,6
Tarn	19.5	16,7	13,6	14,4	19,2
Tarn-et-Garonne	16,2	16,0	14,3	12,3	10,6
Var	20,1	15,0	12,7	25,4	15,4
Vaucluse	19,1	16,4	14,6	14,1	11,0
Vendée	22,6	20,9	19,5	7,5	6,7
Vienne	19,0	17,5	16,1	7,9	8,0
Vienne (Haute-)	23,7	16,3	12,9	31,3	20,8
Vosges	25,0	20,1	17,4	19,6	13,4
Yonne	15,3	16,1	13,8	+ 5,2	14,3
FRANCE ENTIÈRE	*21,3*	*18,4*	*15 »*	*13,6*	*18,5*

CHAPITRE II

MORTINATALITÉ

La mortinatalité est envisagée dans ce chapitre comme vient de l'être la natalité, c'est-à-dire qu'après avoir exposé son évolution de 1930 à 1936, en nombres absolus et en proportions pour 1.000 naissances totales (Tableau I), nous avons considéré sa fréquence de 1901-1905 à 1925-1929, puis de cette dernière période à 1936 (Tableau II).

On constatera non seulement la stabilité des taux français depuis 1929, mais encore, ce qui est plus inquiétant, les oscillations positives survenues dans de nombreux départements. Il n'est pas douteux que la dénatalité soit également aggravée, tout au moins partiellement, par cette surmortalité fœtale. Nous pensons, en effet, qu'à côté de l'œuvre médicale, dont l'importance se traduit, pour les 30 premières années de ce siècle, par une réduction de ce déchet égale à 20 pour cent, il est plus que jamais nécessaire de préconiser et d'instituer une action moralisatrice. Il est inconcevable de trouver aujourd'hui des taux de mortinatalité tels que ceux des Alpes-Maritimes (52,0), de la Seine (48.1), du Gard (46,8), etc., alors que la mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) a rétrocédé, nous allons le voir, dans de plus satisfaisantes proportions.

Les autorités locales qui ont accepté la lourde tâche, par ailleurs si humaine, d'organiser et de diriger la protection de la santé publique doivent tout mettre en œuvre pour combattre au plus tôt et aussi efficacement que possible de telles inégalités.

Tableau I (suite). — *Mortinatalité enregistrée de 1930 à 1936*. — Nombre absolu et proportion pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis).

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1335		1936	
	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀
Ain	144	25,7	153	28,7	152	28,2	150	30,5	134	28,4	116	25,2	117	26,1
Aisne	330	30,4	352	32,9	328	32,2	352	36,9	349	36,8	292	32,4	312	36,1
Allier	188	33,5	191	33,5	171	31,4	193	36,5	174	33,9	174	34,7	168	34,8
Alpes (Basses-)	54	38,3	47	35,9	47	36,7	35	29,9	50	45'8	33	30,0	28	26,5
Alpes (Hautes-)	49	31,2	38	24,7	54	33,8	58	38,7	62	40,3	59	43,3	61	41,5
Alpes-Maritimes	355	49,5	310	43,2	385	54,7	314	47,8	354	54,7	330	54,3	310	52,0
Ardèche	180	35,2	182	36,9	182	37,6	148	31,7	169	37,3	173	40,3	155	36,8
Ardennes	221	35,4	218	35,1	217	35,9	194	35,1	190	32,9	185	34,2	185	35,1
Ariège	76	30,7	71	32,1	60	27,6	61	30,8	69	34,9	84	44,4	64	34,0
Aube	137	29,5	120	27,3	147	33,8	158	38,4	156	35,9	136	33,2	115	29,3
Aude	169	34,3	143	30,5	174	36,3	185	41,2	174	39,9	159	38,6	147	40,1
Aveyron	226	37,3	207	35,2	185	32,0	203	37.9	180	33,1	194	37.7	180	35,1
Belfort (Territoire de)	97	45,5	102	47,7	96	48,6	68	36,9	67	36,2	71	40,3	74	43,7
Bouches-du-Rhône	659	41,7	647	42,3	694	44,8	615	42,1	608	42,7	541	41,0	488	37,5
Calvados	243	26,6	272	30,0	308	34,5	240	28,3	240	27,7	255	31,5	273	34,2
Cantal	113	30,8	91	25,3	133	36,1	118	31,9	83	24,2	102	31,4	102	32,3
Charente	179	32,0	166	30,8	183	33.3	211	39,9	170	31,9	172	34,1	145	29,0
Charente-Inférieure	226	29,1	262	34,1	260	33,8	250	34,2	251	35.0	234	33,9	237	35,2
Cher	137	31,0	145	33,0	147	34,3	140	34,3	138	34,7	126	32,5	124	31,7
Corrèze	111	25,8	114	27,4	131	31,9	123	31,3	118	30,1	113	30.3	112	31,5
Corse	116	29.4	122	31,4	116	30,3	117	28,9	123	33,5	125	33,9	106	30,0
Côte-d'Or	156	26,6	162	28,3	148	25.8	161	28,7	161	29,5	140	26,8	169	31,5
Côtes-du-Nord	444	37,6	417	36,3	379	32,7	396	36,0	375	35,0	344	34.4	351	34,8
Creuse	71	23,0	62	21,4	66	22,7	86	30,9	73	25,7	50	19,9	65	25,7
Dordogne	231	34,1	195	29,0	217	32,4	211	34,3	207	33,8	176	30,2	193	33,9
Doubs	240	37,3	199	31,5	255	41,1	235	40,3	200	34,7	211	38,4	243	44,2
Drôme	127	29,6	136	32,8	147	36,3	144	36,7	132	34,1	148	38,8	137	37,9
Eure	204	32,4	170	27,1	217	35,4	188	31,0	201	33,9	191	33,9	191	35,1
Eure-et-Loir	169	33,3	161	32,3	165	33,8	138	30,2	136	28.3	137	30,4	118	27,4
Finistère	539	34,1	541	34,9	548	34,8	477	32,6	550	36,7	511	35,5	503	35,5
Gard	241	38,1	278	44,8	256	42,2	254	45,7	226	41,4	261	49,7	241	46,8
Garonne (Haute-)	231	33,4	225	33,4	230	33,3	218	34,0	227	34,1	231	36,3	259	41,2

Tableau I (suite). — *Mortinatalité enregistrée de 1930 à 1936.* — Nombre absol et proportion pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis).

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀
Gers	100	34,2	107	36,6	80	26,7	84	27,8	73	26,6	87	33,1	85	31,0
Gironde	494	35,8	457	35,2	467	35,1	403	32,5	458	38,1	401	34,3	462	36,7
Hérault	279	34,7	282	36,5	306	41,3	234	32,8	257	37,1	280	43,0	201	32,9
Ille-et-Vilaine	503	40,3	455	37,6	472	38,4	403	34,8	388	33,7	418	39,1	375	34,6
Indre	110	25,9	123	30,2	144	36,0	132	35,7	114	29,6	120	31,8	80	22,6
Indre-et-Loire	213	35,4	181	30,4	235	37,7	204	34,7	224	37,1	241	41,3	234	40,7
Isère	339	47,8	301	30,5	310	33,4	314	35,3	273	31,7	268	33,3	249	30,4
Jura	135	30,9	147	34,8	143	35,3	149	38,6	127	35,4	135	38,5	112	32,3
Landes	128	30,0	94	23,6	123	29,9	105	28,5	121	33,0	94	26,9	104	30,1
Loir-et-Cher	137	30,9	131	30,1	129	29,5	122	29,2	129	30,5	105	26,5	121	30,2
Loire	513	43,8	391	35,2	484	44,8	430	40,6	440	43.6	402	41,8	427	44,3
Loire (Haute-)	146	32,5	112	25,8	140	32,7	145	33,4	136	32,9	140	35,4	150	38,6
Loire-Inférieure	396	31,9	353	29,0	439	35,5	421	35,7	406	35,0	398	36,5	370	33,0
Loiret	172	28,4	172	29,4	189	31,9	171	30,6	168	29,1	189	34,8	192	35,4
Lot	93	37,0	93	37,0	99	40,3	94	40.5	85	37,6	96	43,4	86	38,4
Lot-et-Garonne	149	37,6	129	34,0	159	39,3	163	42,9	137	36.1	136	36,9	120	32,8
Lozère	63	33,9	66	38,4	71	39,7	51	31,5	51	29,8	49	31,8	56	35,4
Maine-et-Loire	303	33,3	254	28,3	272	29,5	293	33,3	278	31,4	246	30,1	260	30,8
Manche	309	30,3	313	30,7	335	33,2	299	30,8	330	33,2	312	33,1	306	31,7
Marne	338	39,7	318	38,0	298	36,9	297	38,3	295	37,0	253	33,7	270	36,8
Marne (Haute-)	124	32,3	106	28,1	92	25,8	115	33,2	114	32,5	89	27,0	128	37,8
Mayenne	192	33,9	160	29,0	196	34,0	188	34,1	154	29,1	142	27,8	152	30.4
Meurthe-et-Moselle	525	38,3	486	36,0	481	36,4	431	36,2	428	35,1	416	38,1	386	35,7
Meuse	135	30,3	135	30,3	149	33,9	140	34.1	116	28,7	104	25,8	134	35,0
Morbihan	505	40,7	484	39,4	512	41,3	543	43,5	465	38,4	427	38,4	425	38,0
Moselle	612	39,0	605	39,2	542	36,3	469	34.2	433	31,4	423	32,3	404	30,4
Nièvre	127	31,8	112	28,8	127	33,3	120	33,7	113	31,5	100	29,2	101	30,1
Nord	1.626	37,7	1.430	33,7	1.552	38,1	1.441	38.3	1.352	36,3	1.243	36,1	1.259	37,2
Oise	293	35,1	254	30,7	251	30,9	250	32,8	240	30,5	238	33,1	260	37,0
Orne	180	31,3	188	33,3	192	34,3	184	34,4	169	30,3	165	32,6	153	31,0
Pas-de-Calais	1.148	37,5	1.080	34,9	1.106	38,2	1.055	39,4	993	37,5	964	39,7	992	41,2
Puy-de-Dôme	258	32,1	218	29,2	243	33,1	243	34,3	268	37,7	246	36,9	252	39,5

Tableau I — (suite). *Mortinatalité enregistrée de 1930 à 1936.* — Nombre absolu et proportion pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis).

DEPARTEMENTS	1930		1931		1933		1934		1933		1935		1936	
	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀	Nombre de mort-nés.	°/₀₀
Pyrénées (Basses-)	261	33,0	221	28,2	245	31,6	241	34,5	203	28,8	246	37,3	208	31,0
Pyrénées (Hautes-)	88	27,8	107	34.1	117	39,8	127	42,4	106	36,7	99	35,4	123	45,6
Pyrénées-Orientales	115	33,7	126	37,8	134	39,9	106	33,8	114	38,1	108	37,1	108	38,1
Rhin (Bas-)	382	27,9	349	25,8	440	32,6	347	27,1	307	23,8	300	24,4	346	28,8
Rhin (Haut-)	378	37,1	357	35,4	323	33,6	329	37,1	315	35,4	274	34,3	270	33,5
Rhône	588	33,5	555	33,4	530	33,7	452	30,1	506	34,7	453	32,8	386	29,2
Saône (Haute-)	121	29,2	107	27,2	115	39,1	120	32,2	127	34,5	117	32,5	93	25,7
Saône-et-Loire	303	31,7	304	32,5	321	35,6	315	36,8	306	35,7	284	35,3	259	33,2
Sarthe	302	36,1	276	34,5	325	39,6	299	38,0	317	39,2	244	31,2	264	34,6
Savoie	142	32,1	114	26,5	136	30,7	127	30,6	127	31,1	113	29,1	107	27,3
Savoie (Haute-)	174	38,3	178	39,3	165	35,5	162	36.1	152	34,7	167	38,6	136	32,1
Seine	4.064	49,3	3.129	39,2	3.664	46,9	3.570	48,7	3.757	52,3	3.151	47,2	3.139	48,1
Seine-Inférieure	774	38,1	730	36,9	748	38,2	710	38,6	728	38,9	633	35,7	668	37,8
Seine-et-Marne	257	35,0	220	30,2	224	32,0	199	29,8	206	31,3	184	30,6	175	29,1
Seine-et-Oise	770	36,7	699	33,3	845	40,4	683	35,0	674	36,0	683	38,2	638	36,2
Sèvres (Deux-)	167	27,4	153	27,4	168	27,5	178	30,3	167	28,0	168	28,9	164	29,1
Somme	323	33,9	267	28,8	250	27,6	300	34,2	295	33,7	278	33,0	250	30,9
Tarn	195	38,9	178	35,2	178	35,1	147	30,1	170	37,7	156	36,9	157	37,5
Tarn-et-Garonne	69	26,4	81	29,4	99	35,2	97	37,6	101	38,0	80	33,5	75	30,9
Var	238	44,6	211	39,6	203	36,5	220	40,7	198	36,2	216	41,6	209	39,8
Vaucluse		52,0	178	43,8	190	46,9	176	43,9	213	53,0	168	44,0	167	44,5
Vendée	227	27,0	216	26,0	222	26,6	224	27,7	236	29,4	207	28,1	193	29,4
Vienne	174	31,2	161	30,0	157	28,4	175	32.9	171	32,0	167	32,3	156	30,5
Vienne (Haute-)	174	30,7	134	24,4	182	34,1	172	33,7	156	30,5	137	28,7	140	31,5
Vosges	253	31,9	280	37,0	284	38,0	283	39,7	264	37,1	291	41,4	261	38,3
Yonne	158	35,4	133	30,5	136	32,2	132	31,6	124	30,7	130	34,1	132	34,0
FRANCE ENTIÈRE	*28.224*	*36,3*	*25.710*	*33,8*	*27.537*	*36,7*	*26.025*	*36,6*	*25.722*	*36,6*	*24.055*	*36,3*	*23.663*	*36,2*

TABLEAU II. — Diminution du taux de la mortinatalité depuis 1901
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DEPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936
Ain	39,5	33,5	26,1	15,2	22,1
Aisne	45,8	35,2	36,1	23.1	+ 2,6
Allier	33,9	31,7	34,8	6,5	+ 9.8
Alpes (Basses-)	49,7	35,8	26,5	28,0	26,0
Alpes (Hautes-)	55,4	30,5	41,5	45,0	+ 36,2
Alpes Maritimes	72,0	50,8	52,0	29,4	+ 2,4
Ardèche	44,1	36,4	36,8	17,4	+ 1,1
Ardennes	41,0	34,7	35,1	15,4	+ 1,2
Ariège	32,9	35,7	34,0	+ 8,5	4,8
Aube	48,5	33,6	29,3	30,7	12,8
Aude	47,8	38,0	40,1	20,5	+ 5,5
Aveyron	47,3	35,0	35,1	26,0	+ 0,3
Belfort (Territoire de)	54,3	40,6	43,7	25,2	+ 7,6
Bouches-du-Rhône	69.2	44,5	37,5	35,7	15,7
Calvados	42,9	30,7	34.2	28,4	+ 11,4
Cantal	31,1	33,0	32,3	+ 6,1	2,1
Charente	39,0	33,2	29,0	14,9	12.6
Charente-Inférieure	43,3	33,1	35,2	23,6	+ 6,3
Cher	33,0	29,1	31,7	11,8	+ 9,0
Corrèze	32,4	30,9	31,5	4,6	+ 1,9
Corse	11,0	27,8	30,0	+ 148,0	+ 7,9
Côte-d'Or	36,1	26,6	31,5	26,3	+ 18,4
Côtes-du-Nord	46,3	32.5	34,8	27,6	+ 7,1
Creuse	29,2	26,4	25.7	9,6	2,6
Dordogne	41,8	35,0	33,9	16,2	3,1
Doubs	56,3	34,7	44.2	39,1	+ 27,4
Drôme	49,2	37,5	37,9	23,8	+ 1,1
Eure	43,3	29,9	35,1	31,0	+ 17,4
Eure-et-Loir	40,7	28,4	27,4	30,2	3,5
Finistère	40,6	32,8	35,5	19,2	+ 8,2
Gard	50,4	40.7	46,8	19,2	+ 15,0
Garonne (Haute-)	40,6	37,1	41,2	8,6	+ 11,0

TABLEAU II (suite). — *Diminution du taux de la mortinatalité depuis 1901*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DÉPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936
Gers	39,2	35,1	31,0	10,5	11,7
Gironde	46,5	35,5	36,7	23,7	+ 3,4
Hérault	47,4	37,9	32,9	20,0	13,2
Ille-et-Vilaine	47,7	38,1	34,6	20,1	9,2
Indre	30,8	30,1	22,6	2,3	24,9
Indre-et-Loire	45,7	33.3	40,7	27,1	+ 22,2
Isère	50,2	34,5	30,4	31,4	11,9
Jura	48,9	33,1	32,3	32,3	2,4
Landes	34,5	27,5	30,1	20,3	+ 9,5
Loir-et-Cher	36,8	28,5	30,2	22,7	+ 6.0
Loire	52,8	36,1	44.3	31,7	+ 22,7
Loire (Haute-)	46,4	33,7	38,6	27,4	+ 14,6
Loire-Inférieure	43,1	33,9	33,0	21,3	2,7
Loiret	34,7	29,0	35,4	16,4	+ 22,0
Lot	38,0	33,7	38.4	11,3	+ 14,0
Lot-et-Garonne	44,5	38,0	32,8	14,6	13,7
Lozère	49,7	29,7	35,4	40,3	+ 19.2
Maine-et-Loire	43,4	29,8	30,8	31,4	+ 3,4
Manche	46,2	30,4	31,7	34,2	+ 4,3
Marne	48,2	33,7	36,8	30,1	+ 9,2
Marne-Haute	44,0	30,5	37,8	30,7	+ 24,0
Mayenne	43.0	32,0	30,4	25,6	5,0
Meurthe-et-Moselle	42,3	34,5	35,7	18,4	+ 3,5
Meuse	41.9	30,8	35,0	26,5	+ 13,6
Morbihan	43,6	43,3	38,0	0,7	12,2
Moselle	»	37,9	30,4	»	19,8
Nièvre	31,3	31,7	30,1	+ 1,3	5,1
Nord	47,9	35,7	37,2	25,5	+ 4,2
Oise	39,5	31,7	37,0	19,8	+ 16,7
Orne	44,4	33,1	31,0	25,4	6,4
Pas-de-Calais	41,0	36,8	41,2	10,2	+ 12,0
Puy-de-Dôme	42,4	32,8	39,5	22,7	+ 20,4

TABLEAU II (suite). — *Diminution du taux de la mortinatalité depuis 1901*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DEPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 à 1929	DIMINUTION EN % (b) 1925-1929 à 1936
Pyrénées (Basses-)	28,1	29,1	31,0	+ 3,9	+ 6,5
Pyrénées (Hautes-)	42,5	34,4	45,6	19,0	+ 32,6
Pyrénées-Orientales	43,3	35.8	38,1	17,3	+ 6,4
Rhin (Bas-)	»	31,9	28,8	»	9,7
Rhin (Haut-)	»	35,3	33,5	»	5,1
Rhône	53,3	34,2	29,2	35.9	14,6
Saône (Haute-)	39,9	28,8	25,7	27,8	10,7
Saône-et-Loire	39,4	32,1	33,2	18,1	+ 3,4
Sarthe	45,6	33,7	34,6	26,1	+ 2,7
Savoie	56,5	32,9	27,3	41,8	17,0
Savoie (Haute-)	56,3	37.0	32,1	34.3	13,2
Seine	75,5	56,3	48,1	26,4	14,6
Seine Inférieure	50,5	36,6	37,8	27,5	+ 3,3
Seine-et-Marne	41,0	30,8	29,1	24,9	5,5
Seine-et-Oise	44,2	35,2	36,2	20,3	+ 2,8
Sèvres (Deux-)	32,7	26,9	29,1	17,7	+ 8,2
Somme	44,2	30,8	30,9	30,3	+ 0,3
Tarn	40,2	33,8	37,5	15,9	+ 10,9
Tarn-et-Garonne	46,0	35,4	30.9	24,4	12,7
Var	50,0	41,0	39.8	18,0	2,9
Vaucluse	58,7	46,4	44,5	21,0	4,1
Vendée	33,1	26,1	24,9	21,1	4,6
Vienne	36,5	28,0	30,5	23,3	+ 8,9
Vienne (Haute-)	35,2	29,8	31,5	15,3	+ 5,7
Vosges	50,1	35,1	38,3	30,0	+ 9,1
Yonne	37,0	27,7	34,0	42,7	+ 22,7
FRANCE ENTIÈRE	*45,2*	*36,2*	*36,2*	*20,0*	»

CHAPITRE III

MORTALITÉ INFANTILE

CHAPITRE III

MORTALITÉ INFANTILE

(0 à 365 jours).

Avec la mortalité infantile, nous pénétrons dans une atmosphère plus optimiste, comme le certifieront les tableaux I et II. Le premier fait connaître, année par année, l'évolution récente tandis que le second la place sur un terrain essentiellement rétrospectif, puisque la durée d'observation interdécennale remonte à 1861.

S'il est très intéressant d'étudier en détail pour chaque région les fluctuations qui sont intervenues au cours de cette période, il suffira de résumer dans ce bref commentaire la situation pour l'ensemble du pays: De 1861 à 1901 (40 ans), la diminution a été de 25, 3 %, les taux étant passés de 190 à 142 décès de 0 à 1 ans pour 1.000 naissances vivantes. De 1901 à 1936 (36 ans), le déclin a été beaucoup plus sensible, il atteint 52, 8%, les proportions ayant évolué de 142 à 67 ‰.

Nous apportons donc là, avec le tableau III, tous les éléments pour justifier les efforts qui ont été demandés en faveur de la lutte contre la mortalité infantile. Mais, nous avons là aussi la preuve que l'œuvre n'est pas terminée puisque subsistent de nombreuses inégalités. Les départements de la Haute-Loire (95, 7 décès de moins d'un an pour 1.000 naissances vivantes), du Pas-de-Calais (92, 7), du Cantal (84,3), de l'Ardèche (81,8), des Ardennes (81,3), de l'Oise (80,5), des Côtes-du-Nord (80,2), de la Meuse (80,0) ont, comparativement aux Alpes-Maritimes (43,8), à la Vendée (44,4), au Territoire de Belfort (46,3), à l'Aude (48,7), à la Loire-Inférieure (49,3), à la Vienne (49,5), aux Pyrénées-Orientales (49,7), l'impérieux devoir de réaliser sans tarder une meilleure hygiène infantile.

De même, le taux français (67,0) peut rapidement être ramené au niveau de celui des nations européennes les plus favorisées (Tableau IV). C'est une question d'initiatives et de volonté à laquelle les médecins, les hygiénistes, les collectivités privées comme les pouvoirs publics, doivent résoudre au plus tôt et d'une manière efficace. Il s'agit de sauver chaque année 18.300 nouveau-nés; c'est un minimum, puisque basé sur le taux hollandais qui reste lui-même améliorable.

A cet exposé, ajoutons encore que, pour connaître le véritable déchet de la natalité, il serait intéressant d'envisager, dans le cadre départemental, à la fois la mortalité infantile et la mortinatalité, cette dernière étant assez souvent constituée par des enfants nés viables, mais décédés avant le délai de 3 jours accordé pour leur déclaration à l'état civil.

A titre d'exemple, nous avons recherché ce déchet pour 3 de nos départements et pour l'ensemble du pays.

	Mort-nés.	Décès de 0 à 1 an.	Total. (1)
Alpes-Maritimes	310	248	558 (93,5)
Haute-Saône	93	232	325 (90.3)
Vendée	193	337	530 (68,2)
France entière	23.663	42.243	65.906 (101)

Il ressort de cette simple comparaison que l'ensemble du déchet est de 68,2 pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis) dans le département de la Vendée, tandis qu'il atteint 90,3 dans la Haute-Saône, 93,5 dans les Alpes-Maritimes et 101 pour pour l'ensemble du pays. Autrement dit, nous laissons mourir chaque année le dixième de notre natalité. Ce triste record se passe de commentaires.

(1) Proportion des mort-nés et des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances totales.

Tableau I. — Mortalité infantile enregistrée de 1930 à 1936. — Décès de 0 à 1 an et proportion pour 1.000 naissances vivantes.

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo
Ain	376	69,0	391	75,3	327	62,3	354	73,7	257	56,1	209	46,7	276	63,2
Aisne	801	76,4	835	80,2	721	72,8	688	74,9	675	73,9	628	72,0	635	76,3
Allier	305	56,2	317	57.4	305	57,7	299	58,7	283	57,2	259	53,3	254	54,5
Alpes (Basses-)	104	76,8	94	74,7	79	63,9	62	54,3	52	50,1	65	61,0	73	70,9
Alpes (Hautes-)	109	71,9	109	72,8	131	84,5	100	68,9	113	76,3	94	72,3	88	62,3
Alpes-Maritimes	489	71,7	573	83,3	453	68,2	378	60,3	334	53,4	312	54,3	248	43,8
Ardèche	506	103,0	448	94,5	351	75,5	393	7,0	316	72,3	336	81,5	331	81,8
Ardennes	473	78,3	390	65,1	436	74,8	400	75,1	384	68,6	361	69,0	414	81,3
Ariège	156	65,0	167	78,3	134	63,5	110	7,2	117	61,3	91	50,5	95	52,2
Aube	348	77,1	320	74,1	258	61,4	290	73,2	309	73,7	251	63,5	250	65,3
Aude	313	65,7	312	68,7	329	71,3	268	62,1	283	67,5	208	52,5	171	48,7
Aveyron	493	84,5	518	1,	506	90,3	414	80,4	434	82,4	390	78,5	361	72,9
Belfort (Territoire de)	136	67,0	134	69,2	90	47,6	98	55,1	88	49,4	102	60,8	75	46,3
Bouches-du-Rhône	1.163	76,8	1.276	87,1	1.073	72,3	853	61,2	877	64,3	827	65,2	739	59,1
Calvados	916	91,3	734	83,2	773	89,6	705	85,4	656	78,0	640	81,7	576	74,7
Cantal	359	101,0	306	87,2	332	93,4	316	88,2	315	94,0	269	85,5	258	84,3
Charente	334	61,7	316	60,4	359	67,5	311	61,2	262	50,7	339	69,5	256	53,3
Charente-Inférieure	432	57,3	461	62,1	497	66,7	511	72,2	395	57,1	432	64,7	372	57,1
Cher	247	57,7	230	54,2	216	52,0	209	53,1	210	54,4	187	49,7	203	53,7
Corrèze	296	70,7	276	68,3	291	73,3	258	67,8	278	73,0	277	76,7	194	56,3
Corse	322	84,2	358	94,8	286	76,9	299	76,1	313	88,4	313	88,3	270	79,0
Côte d'Or	393	68,8	390	70,1	370	66,2	323	59,2	344	65,0	322	63,4	306	59,1
Côtes-du-Nord	1.023	90,0	886	79,7	1.065	95,2	918	86,7	964	92,7	777	80,3	780	80,2
Creuse	159	52,8	138	48,6	162	57,1	151	55,9	134	48,6	162	66,0	124	50,3
Dordogne	357	54,7	402	61,6	419	64,8	410	69,0	362	61,3	343	60;5	306	55,4
Doubs	487	78,5	509	83,1	465	78,1	388	69,3	382	68,5	339	64,3	347	66,0
Drôme	325	78,0	250	62,5	285	73,2	260	69,0	234	62,7	208	56,7	194	55,7
Eure	501	83,5	502	82,1	482	81,4	456	77,7	403	70,5	388	71,3	391	74,3
Eure-et-Loir	404	82,5	419	87,0	395	84,0	357	80,5	280	60,2	294	67,2	282	67,5
Finistère	1.067	69,7	914	61,0	1.013	66,5	1.023	72,3	931	64,7	866	62,3	819	59,8
Gard	438	72,0	508	85,1	398	68,7	398	75,0	325	62,0	321	64,4	303	61,7
Garonne (Haute-)	466	69,8	469	72,0	422	63,1	504	81,3	385	59,9	358	58,3	307	50,9

Tableau I (suite). — *Mortalité infantile enregistrée de 1930 à 1936.* —

Décès de 0 à 1 an et proportion pour 1.000 naissances vivantes.

DEPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀	Décès.	°/₀₀
Gers	174	61,5	193	68,5	166	57,3	154	52,3	144	54,2	132	52,1	149	56,2
Gironde	781	58,7	788	63,1	894	69,3	704	58,7	604	51,2	578	51,1	586	53,2
Hérault	465	59,8	568	76,0	447	63,0	449	65,0	391	58,7	318	51,0	301	50,9
Ille-et-Vilaine	965	80,5	923	79,5	1.164	97,5	980	87,5	947	85,3	859	82,5	811	77,3
Indre	249	60,2	231	58,7	224	58,2	162	45,4	227	60,8	218	59,8	194	56,0
Indre-et-Loire	397	68,2	392	67,9	382	63,8	365	64,2	424	72,8	320	57,1	328	59,5
Isère	835	85,7	816	85,3	638	71,0	615	70,8	576	68,8	538	69,3	487	61,3
Jura	289	68,3	303	74,3	251	64,4	220	59,2	178	51,3	212	63,0	218	64,8
Landes	208	50,3	196	50,5	229	57,4	197	55,2	154	43,3	180	53,0	180	53,7
Loir-et-Cher	247	57,3	245	58,1	237	55,9	215	53,0	241	58,8	199	51,8	211	54,2
Loire	994	89,5	927	85,7	830	80,6	761	74,7	716	74,1	666	72,5	598	65,0
Loire (Haute-)	432	99,2	412	97,5	421	101,0	418	99,5	373	98,3	380	99,3	355	95,7
Loire-Inférieure	715	59,5	688	58,3	734	61,2	767	67,8	671	59,9	530	50,5	532	49,3
Loiret	344	58,5	379	66,7	387	67,3	337	62,1	335	59,8	322	61,5	280	53,5
Lot	166	69,0	213	88,0	172	72,8	191	85,6	161	74,3	165	78,3	153	70,8
Lot-et-Garonne	237	62,2	239	65,3	307	79,1	214	58,8	235	64,1	203	57,2	218	61,5
Lozère	119	66,5	147	88,6	102	59,3	112	71,3	109	65,7	118	79,3	111	73,0
Maine-et-Loire	550	62,7	492	56,3	524	58,7	563	66,3	549	64,1	509	64,2	446	54,5
Manche	735	74,3	698	70,7	841	85,9	696	73,9	704	73,2	643	70,5	646	69,2
Marne	688	84,2	613	76,2	607	78,0	607	81,3	556	72,5	548	76,7	488	69,0
Marne (Haute-)	279	75,1	257	69,8	218	62,8	274	82,1	220	64,7	225	70,5	244	74,7
Mayenne	381	69,5	386	72,1	373	66,9	397	74,4	341	66,3	347	69,8	356	73,7
Meurthe-et-Moselle	1.225	93,5	1.070	82,3	1.046	82,7	927	81,3	716	62,8	806	76,8	793	76,3
Meuse	351	81,5	364	84,0	321	75,6	346	87,2	290	74,0	295	75,3	295	80,0
Morbihan	993	84,0	919	77,7	1,079	90,8	1.028	85,8	1.031	88,8	957	89,5	811	75,2
Moselle	1.378	91,5	1.235	83,8	1.153	80,2	1.068	81,1	1.035	77,7	1 013	79,7	978	75,7
Nièvre	249	64,3	249	66,0	247	66,8	179	52,1	166	47,8	192	57,8	197	60,6
Nord	3.741	90,2	3.042	74,3	3.168	81,1	3.174	87,6	2 658	74,2	2.431	73,3	2.383	73,0
Oise	675	83,8	609	76,0	623	79,2	655	88,7	568	74,5	571	82,3	545	80,5
Orne	457	82,0	458	84,1	455	84,1	394	76,2	373	68,8	373	76,0	323	67,5
Pas-de-Calais	2.968	100,0	2.581	86,7	2.781	99,3	2.688	104,0	2.285	89,7	2.203	94,3	2.143	92,7
Puy-de-Dôme	467	60,0	547	75,3	440	61,9	465	67,9	424	62,2	397	61,7	361	59,0

Tableau I (suite). — *Mortalité infantile enregistrée de 1930 à 1936.* — Décès de 0 à 1 an et proportion pour 1.000 naissances vivantes.

DÉPARTEMENTS	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo	Décès.	°/oo
Pyrénées (Basses-)	525	68,5	474	62,2	500	66,7	434	64,3	404	59,1	387	61,0	418	64,3
Pyrénées (Hautes-)	227	73,8	177	58,2	201	71,0	165	57,7	160	57,6	175	65,0	143	55,5
Pyrénées-Orientales	222	67,3	250	77.8	181	56,0	205	67,7	188	65,1	118	42,0	136	49,7
Rhin (Bas-)	908	68,3	979	74,7	916	70,4	779	62,8	800	63,5	875	72,9	861	74,7
Rhin (Haut-)	589	59,8	602	61,8	536	57,7	465	54,4	448	52,3	401	52,0	416	53,4
Rhône	1.515	89,0	1.441	90,0	1.322	86,8	1.034	71,0	991	70,3	921	69,3	884	69,0
Saône (Haute-)	318	78,8	293	76,7	279	72,5	222	61,4	222	62,3	244	70,1	232	65,9
Saône et-Loire	606	65,5	696	76,8	603	69,3	523	63,5	500	60,6	474	61,2	509	67.4
Sarthe	733	91,0	720	93,3	694	88.2	621	82,0	602	77,3	640	84,3	569	77,3
Savoie	374	87,2	39,3	94,0	298	69,3	322	80,3	282	71,3	267	71,0	221	58,0
Savoie (Haute-)	330	75,5	323	74,0	327	72,8	292	67,5	277	65,4	295	70,7	274	66,9
Seine	6.870	88,0	6.115	79,7	5.990	80,5	5.386	77,2	5.206	76,3	4 460	70,3	4.416	71,3
Seine-Inférieure	1.836	94,5	1.673	87,5	1.850	98,2	1.618	91,5	1.367	76,2	1.449	85,3	1.316	77,5
Seine-et-Marne	635	89,7	542	76,4	612	90,3	501	77,3	490	76,8	422	72,3	430	73,5
Seine-et-Oise	1.839	91,2	1.542	75,9	1.478	87,1	1.647	87,7	1.327	73,5	1.178	68,5	1.068	63,0
Sèvres (Deux-)	322	54,3	307	53,0	349	58,8	345	60,5	339	58,4	327	58,0	275	50,3
Somme	812	88,1	758	84,2	722	81,9	754	89,0	568	67,0	641	78,7	596	76,0
Tarn	304	63,1	366	75,1	325	66,4	273	57,7	272	62,7	261	64,0	248	61,6
Tarn-et-Garonne	199	79,7	236	88,3	211	77,8	206	83,0	180	70,3	171	74,2	136	57,8
Var	330	64,7	431	84,3	459	85,6	380	73,3	368	69,8	340	68,2	289	57,3
Vaucluse	236	59,2	289	74,5	269	69,8	225	58,7	199	53,3	175	48,0	495	54,2
Vendée	369	45,2	377	46,6	416	51,1	459	58,3	408	52,4	355	45,8	337	44.4
Vienne	303	56,0	300	57,4	340	63,3	291	56,5	275	53,1	283	56,6	245	49,5
Vienne (Haute-)	349	63,4	353	66,1	278	53,9	278	56,3	273	55,1	250	53,9	219	50,8
Vosges	633	82,5	591	81,3	570	79,3	516	75,4	500	73,0	507	75,3	496	75,5
Yonne	320	74,3	300	71,0	297	72,5	248	61,3	246	62,8	244	66,3	263	70,0
FRANCE ENTIÈRE	*58.756*	*78,5*	*55.655*	*76,0*	*55.177*	*76.4*	*51.015*	*74,7*	*46.989*	*69.4*	*44.267*	*68,7*	*42.243*	*67.0*

TABLEAU II. — Evolution de la mortalité infantile de 1861 à 1936.

Décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

DÉPARTEMENTS	1861	1872	1881	1891	1901	1911	1921	1931	1935	1936
Ain	193	140	154	153	122	128	100	75,3	46,7	63,2
Aisne	253	206	154	160	148	192	108	80,2	72,0	76,3
Allier	145	116	155	112	96,0	98,1	98,0	57,4	53,3	54,5
Alpes (Basses-)	255	169	191	226	145	201	126	74,7	61,0	70,9
— (Hautes-)	236	208	234	254	173	272	139	72,8	72,3	62,3
Alpes-Maritimes	180	177	181	155	139	151	115	83,3	54,3	43,8
Ardèche	264	211	249	234	214	249	149	94,5	81,5	81,8
Ardennes	117	153	133	142	121	150	94,0	65,1	69,0	81,3
Ariège	139	129	136	131	122	140	93,0	78,3	50,5	52,2
Aube	301	182	185	180	166	161	142	74,1	63,5	65,3
Aude	154	160	155	153	127	129	100	68,7	52,5	48,7
Aveyron	166	146	184	204	177	226	136	91,1	78,5	72,9
Belfort (Territoire de)	»	167	158	180	173	169	102	69,2	60,8	46,3
Bouches-du-Rhone	173	177	184	174	165	144	113	87,1	65,2	59,1
Calvados	169	145	138	172	145	187	153	83,2	81,7	74,7
Cantal	206	143	187	158	132	211	131	87,2	85,5	84,3
Charente	190	105	104	118	116	105	102	60,4	69,5	53,3
Charente-Inférieure	200	116	120	118	121	135	112	62,1	64,7	57,1
Cher	162	139	151	141	127	112	76,0	54,2	49,7	53,7
Corrèze	193	156	157	157	132	164	108	68,3	76,7	56,3
Corse	140	182	189	155	116	130	116	94,8	88,3	79,0
Côte-d'Or	256	135	178	149	109	106	88,0	70,1	63,4	59,1
Côtes-du-Nord	178	147	151	151	142	152	133	79,7	80,3	80,2
Creuse	134	127	94,5	106	93,3	84,7	73,0	48,6	66,0	50,3
Dordogne	160	127	122	144	129	134	99,0	61,6	60,5	55,4
Doubs	168	160	167	189	157	161	118	83,1	64,3	66,0
Drôme	220	118	217	217	158	166	106	62,5	56,7	55,7
Eure	284	218	171	178	172	203	157	82,1	71,3	74,3
Eure-et-Loir	355	233	272	240	201	199	158	87,0	67,2	67,5
Finistère	160	141	187	149	120	144	109	61,0	62,3	59,8
Gard	229	204	221	188	157	183	114	85,1	64,4	61,7
Garonne (Haute-)	133	109	140	161	119	150	108	72,0	58,3	50,9

TABLEAU II (suite.) — *Evolution de la mortalité infantile de 1861 à 1936.*

Décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

DEPARTEMENTS	1861	1872	1881	1891	1901	1911	1921	1931	1935	1936
Gers	145	121	128	145	131	125	95,0	68,5	52,1	56,2
Gironde	139	108	137	121	107	116	98,0	63,1	51,1	53,2
Hérault	170	192	176	147	132	137	104	76,0	51,0	50,9
Ille-et-Vilaine	212	155	178	169	155	194	182	79,5	82,5	77,3
Indre	139	128	111	101	110	96,3	83,0	58,7	59.8	56,0
Indre-et-Loire	167	121	123	128	107	131	129	67,9	57,1	59,5
Isère	195	180	186	184	147	165	96,0	85,3	69,3	61,3
Jura	179	129	145	137	136	133	98,0	74,3	63,0	64,8
Landes	142	137	78,7	118	87,5	80,2	77,0	50,5	53,0	53,7
Loir-et-Cher	248	179	186	182	141	146	120	58,1	51,8	54,2
Loire	199	162	169	180	154	160	115	85,7	72.5	65,0
Loire (Haute-)	197	169	199	198	162	183	129	97,5	99,3	95,0
Loire-Inférieure	144	102	131	134	103	116	106	58,3	50,5	49,3
Loiret	260	189	212	187	149	144	113	66,7	61,5	53,5
Lot	167	146	227	134	131	211	144	88,0	78,3	70,8
Lot-et-Garonne	172	147	174	144	123	143	116	65,3	57,2	61,5
Lozère	174	144	162	162	164	224	122	88,6	79,3	73,0
Maine-et-Loire	159	125	132	154	125	120	131	56,3	64,2	54.5
Manche	140	120	129	125	129	151	120	70,7	70,5	69,2
Marne	267	213	204	181	169	195	120	76,2	76,7	69,0
Marne (Haute-)	240	139	173	153	133	139	105	69,8	70,5	74,7
Mayenne	177	116	147	176	147	214	179	72,1	69,8	73,7
Meurthe-et-Moselle	187	165	183	174	145	195	110	82,3	76,8	76,3
Meuse	197	167	162	156	140	174	106	84,0	75,3	80,0
Morbihan	160	145	154	143	139	125	109	77,7	89,5	75,2
Moselle	172	»	»	»	»	»	126	83,8	79.7	75,7
Nièvre	178	128	141	137	129	155	112	66,0	57,8	60,6
Nord	177	106	176	178	164	178	99,5	74,3	73,3	73,0
Oise	261	218	163	183	160	190	130	76,0	82,3	80,5
Orne	202	171	160	194	189	218	151	84,1	76,0	67,5
Pas-de-Calais	156	152	154	143	137	181	136	86,7	94,3	92,7
Puy-de-Dôme	181	147	137	146	123	137	94,0	75,3	61,7	59,0

TABLEAU II (suite.) — *Evolution de la mortalité infantile de 1861 à 1936.*

Décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

DEPARTEMENTS	1861	1872	1881	1891	1901	1911	1921	1931	1935	1936
Pyrénées (Basses-)	122	127	128	128	122	114	106	62,2	61,0	64,3
— (Hautes-)	120	104	134	142	112	145	116	58,2	65,0	55,5
— (Orientales-)	167	149	192	155	139	143	105	77,8	42,0	49,7
Rhin (Bas-)	235	»	»	»	»	»	108	74,7	72,9	74,7
— (Haut-)	217	»	»	»	»	»	89,0	61,8	52,0	53,4
Rhône	147	132	147	156	130	135	107	90,0	69.3	69,0
Saône (Haute)	181	153	156	167	151	146	120	76,7	70,1	65,9
Saône-et-Loire	201	124	134	138	115	118	98,0	76,8	61,2	67,4
Sarthe	222	156	208	193	201	247	209	93,3	84,3	77,3
Savoie	217	183	191	174	165	176	113	94,0	71,0	58,0
— (Haute-)	186	176	175	167	129	142	114	74,0	70,7	66,9
Seine	168	136	176	141	135	129	103	79,7	70,3	71,3
— (Inférieure)	279	231	228	234	208	242	168	87,5	85,3	77,5
Seine-et-Marne	269	216	196	192	165	174	141	76,4	72,3	73,5
Seine-et-Oise	242	205	196	177	162	170	135	75,9	68,5	63,0
Sèvres (Deux-)	160	108	124	120	111	109	108	53,0	58,0	50,3
Somme	249	224	184	185	162	220	135	84,2	78,7	76,0
Tarn	159	143	149	157	156	156	112	75,1	64,0	61,6
Tarn-et-Garonne	179	146	169	184	155	184	132	88,3	74,2	57,8
Var	154	162	160	187	139	130	131	84,3	68,2	57,3
Vaucluse	226	185	250	194	143	139	104	74,5	48,0	54,2
Vendée	139	120	91,2	139	107	109	105	46,6	45,8	44,4
Vienne	156	100	77,0	98,5	97,3	107	94,0	57,4	56,6	49,5
— (Haute-)	141	121	137	135	110	106	91,0	66,1	53,9	50,8
Vosges	192	163	179	197	166	202	116	81,3	75,3	75,5
Yonne	308	269	175	148	133	153	141	71,0	66,3	70,0
FRANCE ENTIÈRE	*190*	*152*	*165*	*160*	*142*	*158*	*117*	*76,0*	*63,7*	*67,0*

TABLEAU III. — *Diminution du taux de la mortalité infantile depuis 1901*

a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DÉPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1921-1929	DIMINUTION EN % (b) de 1925-1929 à 1936
Ain	127 »	77 »	63.2	39,4	17,9
Aisne	149 »	88,3	76,3	40,8	13,6
Allier	92,3	72,8	54,5	21,1	25,1
Alpes (Basses-)	151 »	92 »	70,9	39 »	22,9
Alpes (Hautes-)	186 »	103 »	62,3	44,6	39,7
Alpes-Maritimes	150 »	94,7	43,8	36,9	53,7
Ardèche	219 »	103 »	81,8	33,1	20,6
Ardennes	128 »	82,1	81,3	35,9	1 »
Ariège	123 »	79,9	52,2	35 »	34,6
Aube	151 »	102 »	65,3	32,4	36 »
Aude	128 »	86,5	48,7	32,4	43,7
Aveyron	184 »	103 »	72,9	44 »	29,2
Belfort (Territoire de)	164 »	81,7	46,3	50,2	43,2
Bouches-du-Rhône	156 »	108 »	59,1	30,7	45,3
Calvados	138 »	113 »	74,7	18,1	34 »
Cantal	160 »	104 »	84,3	35 »	18,9
Charente	109 »	75,9	53,3	30,4	29,7
Charente-Inférieure	105 »	73,6	57,1	29,9	22,4
Cher	110 »	62 »	53,7	43.6	13,4
Corrèze	138 »	87 »	56,3	36,9	35,3
Corse	114 »	101 »	79 »	11,4	21,8
Côte-d'Or	116 »	77,5	59,1	33,2	24,7
Côtes-du-Nord	139 »	95,6	80,2	31,2	16,1
Creuse	87,5	58,5	50,3	33,1	14 »
Dordogne	122 »	75 »	55,4	38,5	26.2
Doubs	154 »	87,3	66 »	43,3	24,4
Drôme	153 »	83,7	55,7	45,3	33,5
Eure	151 »	102 »	74,3	32,4	27,1
Eure-et-Loir	186 »	99,3	67,5	46,6	32 »
Finistère	123 »	76,8	59,8	37,6	22,1
Gard	156 »	91,6	61,7	41,3	32,5
Garonne (Haute-)	127 »	85 »	50,9	33 »	40,1

TABLEAU III (suite). — *Diminution du taux de la mortalité infantile depuis 1901.*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DÉPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901 1929	DIMINUTION EN % (b) de 1925-1929 à 1936
Gers	119 »	68,8	56,2	42,1	18,3
Gironde	95,8	83,8	53,2	12,5	36,5
Hérault	128 »	86,1	50,9	32,8	40,8
Ille-et-Vilaine	141 »	97,7	77,3	30,7	20,9
Indre	100 »	62,3	56 »	37,7	10,1
Indre-et-Loire	107 »	75,3	59,5	29,6	20,9
Isère	148 »	96,8	61,3	34,7	36,7
Jura	135 »	76,7	64,8	43,2	15,5
Landes	81,6	59,7	53,7	26,8	10 »
Loir-et-Cher	143 »	74 »	54,2	48,3	26,8
Loire	155 »	97 »	65 »	37,4	33 »
Loire (Haute-)	179 »	113 »	95,7	36,9	15,3
Loire-Inférieure	101 »	75,4	49,3	25,3	34,5
Loiret	139 »	75,7	53,5	45,5	29,3
Lot	156 »	96,7	70,8	38 »	26,8
Lot-et-Garonne	127 »	78,3	61,5	38,4	21,4
Lozère	155 »	89 »	73 »	42,5	18 »
Maine-et-Loire	116 »	73,5	54,5	36,6	25,9
Manche	121 »	83,6	69,2	30,9	17,2
Marne	157 »	90,	69 »	42,4	23,6
Marne (Haute-)	129 »	88,2	74,7	31,6	15,3
Mayenne	140 »	80,2	73,7	42,7	8,1
Meurthe-et-Moselle	153 »	104 »	76,3	32 »	26,6
Meuse	142 »	93,5	80 »	34,2	14,4
Morbihan	125 »	89,8	75,2	28,2	16,3
Moselle	»	109 »	75,7	»	30,6
Nièvre	130 »	69,5	60,6	46,5	12,8
Nord	159 »	91,7	73 »	42,3	20,4
Oise	153 »	105 »	80,5	31,4	23,3
Orne	170 »	101 »	67.5	40,6	33,2
Pas-de-Calais	135 »	107 »	92,7	20,7	13,4
Puy-de-Dôme	125 »	76,5	59 »	38,8	22,9

TABLEAU III (suite). — *Diminution du taux de la mortalité infantile depuis 1901*
a) *période de 25 années* — b) *période de 10 années.*

DEPARTEMENTS	1901 - 1905	1925 - 1929	1936	DIMINUTION EN % (a) 1901-1929	DIMINUTION EN % (b) de 1925-1929 à 1936
Pyrénées (Basses-)	115 »	81,9	64,3	28,8	21,5
Pyrénées (Hautes-)	112 »	88 »	55,5	21,4	37 »
Pyrénées-Orientales	129 »	93,5	49,7	27,5	46.9
Rhin (Bas-)	»	83,1	74,7	»	10,1
Rhin (Haut-)	»	70 »	53,4	»	23,7
Rhône	127 »	98 »	69 »	22,8	29,6
Saône (Haute-)	150 »	85 »	65,9	43,3	22,5
Saône-et-Loire	115 »	77,3	67,4	32.8	12,8
Sarthe	179 »	107 »	77,3	40,2	27,7
Savoie	158 »	96 »	58 »	39,3	39,6
Savoie (Haute-)	142 »	80,7	66,9	43,2	17,1
Seine	122 »	101 »	71,3	17,2	29,4
Seine-Inférieure	200 »	112 »	77,5	44 »	30,8
Seine-et-Marne	161 »	108 »	73,5	32,9	31,9
Seine-et-Oise	147 »	111 »	63 »	24,5	43.2
Sèvres (Deux-)	97 »	65,5	50.3	32,5	23.2
Somme	160 »	101 »	76 »	36,9	24.8
Tarn	154 »	82,7	61,6	46,3	25,5
Tarn-et-Garonne	156 »	96,7	57,8	38,1	40.2
Var	134 »	98 »	57,3	26,9	41,5
Vaucluse	145 »	85,5	54,2	41 »	36,7
Vendée	65 »	59,8	44,4	8 »	25,8
Vienne	92,3	59,6	49,5	35,4	23,6
Vienne (Haute-)	113 »	69 »	50,8	39 »	26,4
Vosges	165 »	96,5	75,5	41,5	21,7
Yonne	128 »	88,5	70 »	30,9	20,9
FRANCE ENTIÈRE	*133 »*	*91,5*	*67 »*	*33,7*	*26,8*

TABLEAU IV. — Evolution de la mortalité infantile en Europe de 1901 à 1935.

Nombre de décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

PAYS	EN 1901.	EN 1935 SAUF INDICATION	DIMINUTION EN °/.
Norvège	91	39 (1934)	57,1
Hollande	149	40	73,2
Suède	101	47	53,4
Suisse	134	48	64,3
Angleterre et Galles	152	57	62,5
Finlande	146	67	54,1
Allemagne	206	68	67,0
France	142	69	51,3
Danemarck	137	71	48,1
Irlande	99	73	26,3
Belgique	140	77	45,0
Ecosse	129	77	40,3
Autriche	209	100	52,3
Italie	166	101	39.1
Espagne	188	109	41,3
Tchécoslovaquie	»	123	»
Pologne	»	127	»
Bulgarie	144	153	+ 6,3
Hongrie	205	154	24,8
Roumanie	203	192	5,4

CHAPITRE IV

Mortalité infantile saisonnière.

Il reste encore à préciser, après l'étude générale du chapitre précédent, quelques caractéristiques de la mortalité infantile. Tout d'abord, son incidence par rapport aux variations atmosphériques, bien que celles-ci ne présentent plus le même danger que naguère.

Le tableau est, à cet égard, essentiellement suggestif, montrant pour l'ensemble du pays l'importante évolution subie par la mortalité de l'enfant de 0 à 365 jours, de 1901-1905 à 1931-1935, les taux mensuels étant rendus comparables parce qu'établis sur la base annuelle. De son examen, nous dégagerons les conclusions suivantes :

a) Les mois d'été ne provoquent plus les mêmes hécatombes que de 1901 à 1905 ; au contraire, la mortalité y apparaît désormais plus faible que de décembre à juin.

b) Les mois de basse température, en particulier, à état hygrométrique élevé, bien que moins meurtriers qu'il y a 30 ans, facilitent l'apparition d'états bronchitiques suffisamment nombreux pour entraîner, encore aujourd'hui, 86, 0 décès d'enfants de moins d'un an pour 1.000 en janvier, 96, 3 en février, 90,1 en mars. Les coefficients des mois d'avril, mai et juin demeurent eux-mêmes trop élevés.

c) Il résulte de ce changement que la régression des risques mortuaires oscille de 35, 2 °/. en mai, 35,8 °/. en février, 36,3 °/. en janvier à 65,4 °/. en août, 62,6 °/. en septembre, 56,9 °/. en juillet.

TABLEAU I. — Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la France entière.
Proportions moyenne de ces décès pour 1.000 naissances vivantes (*base annuelle*).

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	10.112	10.748	11.034	10.076	8.893	8.314	10.894	13.201	12.158	9.921	7.773	8.560	121.684
1902	9.381	9.890	10.086	9.229	9.306	8.391	9.470	11.514	12.239	9.124	7.331	8.294	114.255
1903	9.244	9.140	9.628	8.800	8.921	7.951	9.413	12.741	12.463	10.148	7.084	7.889	113.311
1904	9.559	8.865	9.997	8.844	8.336	7.744	13.338	17.161	11.581	8.318	7.099	7.555	117.997
1905	9.430	9.209	10.234	8.871	8.129	7.536	11.158	13.939	9.857	7.169	6.514	7.587	109.633
1901-1905	47.726	47.206	50.979	45.420	43.465	39.936	54.273	68.556	58.298	44.680	35.801	39.884	576.880
PROPORTIONS...	*135*	*150*	*144*	*133*	*123*	*117*	*154*	*195*	*171*	*127*	*105*	*113*	*138*
1931	6.951	5.831	6.095	4.735	5.441	4.345	3.977	4.077	3.269	3.389	3.443	4.102	55.655
1932	4.711	5.167	5.919	5.197	5.828	4.521	3.896	5.386	4.045	3.641	3.287	4.017	55.615
1933	5.299	5.382	5.048	4.342	4.098	3.491	4.189	4.131	3.520	3.718	3.192	4.362	50.772
1934	4.561	4.260	4.821	4.657	4.398	3.803	4.093	3.203	3.404	3.040	3.036	3.799	47.075
1935	4.675	4.833	4.505	3.740	3.653	4.291	3.244	3.034	3.846	2.835	2.866	3.615	44.137
1931-1935	25.197	25.473	26.388	22.671	23.418	20.451	19.399	19.831	18.084	16.623	15.824	19.895	253.254
PROPORTIONS...	*86,0*	*96,3*	*90,1*	*80,0*	*79,7*	*72,3*	*66,3*	*67,5*	*64,0*	*56,7*	*55,8*	*68,0*	*73,5*
DIMINUTION EN % DE 1901-1905 A 1931-1935	*36,3 %*	*35,8 %*	*37,4 %*	*39,8 %*	*35,2 %*	*38,2 %*	*56,9 %*	*65,4 %*	*62,6 %*	*55,4 %*	*46,9 %*	*39,8 %*	*46,7 %*

CHAPITRE V

MORTALITÉ NÉONATALE

(Décès d'enfants âgés de 0 à 30 jours).

Une autre précision intéressante à étudier est la mortalité néonatale, puisqu'aussi bien elle compte pour plus du tiers de la mortalité infantile. Dans les décès de 0 à 30 jours entrent, en effet, la mortalité précoce des hypotrophiques, des débiles congénitaux, des tarés de toutes sortes. D'autre part, étant donnée la législation en vigueur et pour les raisons invoquées au chapitre III, nous avons, cette fois encore, rapproché la mortinatalité de la mortalité néonatale, et de la mortalité observée du 30e au 364e jour. Nous avons ainsi, comme l'indique le tableau I, pour chaque sexe, et de 1901 à 1935, pour l'ensemble du pays, tous les éléments statistiques relatifs à cette question et qui nous conduisent aux remarques suivantes :

a) Le sexe masculin est toujours plus touché, tant au point de vue de la mortinatalité que de la mortalité infantile.

b) L'évolution des taux est toujours favorable. En prenant comme termes de comparaison les années extrêmes, on enregistre un déclin du taux de la mortinatalité correspondant à 26,0 °/o chez les garçons, 27,7 °/o chez les filles et 26,4 °/o pour les deux sexes réunis.

Pour la mortalité de 0 à 30 jours, comme pour celle du 30e au 364e jour, la réduction approche ou dépasse légèrement 50 °/o ; elle est toutefois un peu plus sensible chez les filles.

c) Il est curieux de noter, en outre, qu'en 1901-1905 comme en 1935, les décès d'enfants âgés de moins d'un mois interviennent pour plus du tiers de la mortalité infantile (décès de 0 à 1 an).

Nous allons maintenant considérer l'évolution de la mortalité néonatale (décès de 0 à 30 jours) pour chacun de nos départements et pour chaque sexe, en opposant la période 1933-1935 à la première période étudiée dans les Livres III et IX, c'est-à-dire 1901-1905. Nous pourrons juger ainsi, en toute connaissance de cause, des gains réalisés.

Sexe masculin

Le tableau II dénonce les inégalités que l'on rencontre encore aujourd'hui, puisqu'elles s'échelonnent de 17,8 décès de garçons de 0 à 30 jours pour 1.000 naissances masculines dans le Territoire de Belfort, 18,4 dans les Basses-Alpes, 18,9 dans les Alpes-Maritimes, 19,8 dans la Vaucluse, à 45,9 dans la Lozère, 48,0 dans les Côtes-du-Nord, pour atteindre le maximun dans le Cantal avec 48,2. C'est dire que lorsqu'il meurt 100 garçons de cet âge dans certains de nos départements, il en décède 260 dans d'autres.

Et pour démontrer que ces inégalités peuvent être atténuées sinon supprimées, nous citerons les faits suivants, que l'on pourra contrôler dans le tableau IV : ce sont les départements qui ont à l'heure actuelle les taux de mortalité les plus faibles qui enregistrent, de

1901 à 1935, la régression la plus sensible (71,7 dans les Basses-Alpes, 70,0 dans les Alpes-Maritimes, 68,0 dans le Territoire de Belfort), alors que le Cantal, les Côtes-du-Nord et la Lozère qui, nous l'avons vu, détiennent les maxima, n'accusent seulement qu'une diminution de 30 à 40 °/₀. De même, le taux français qui est de 29,2 décès de garçons de 0 à 30 jours pour 1.000 naissances masculines, peut encore être amélioré puisque, si intéressant soit-il, le gain réalisé ne correspond qu'à 46,2 °/₀.

Sexe féminin

Les observations que nous avons à formuler quant à la mortalité néonatale de ce sexe sont à peu près identiques à celles faites pour le sexe masculin. En général, ce sont les mêmes départements qui se trouvent aux extrêmes de la comparaison. Nous nous contenterons donc d'ajouter que, sans aucune exception, les taux féminins se trouvent toujours être inférieurs aux taux masculins, avec, bien entendu, des écarts variables. Pour l'ensemble du pays, cet écart est de 18,2 °/₀

Par contre, la diminution enregistrée chez les filles, de 1901 à 1935, est, comme l'indique le tableau IV, inférieure à celle intéressant les garçons : 44,8 pour 100 contre 46,2 pour 100. Hâtons-nous de dire que cette constatation n'est pas générale à tous les départements.

TABLEAU I. — Mortinatalité et mortalité infantile en France de 1901 à 1935

(par périodes quinquennales).

Proportion des mort-nés pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis).

Proportion des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

ANNÉES	NOMBRE DE MORT-NÉS POUR 1.000 NAISSANCES TOTALES			NOMBRE DE DÉCÈS DE MOINS D'UN AN POUR 1.000 NAISSANCES VIVANTES								
				DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS			DÉCÈS DE 30 A 364 JOURS			DÉCÈS DE 0 A 365 JOURS		
	Garçons.	Filles.	Total.	Garçons.	Filles.	Total.	Garçons.	Filles.	Total.	Garçons.	Filles.	Total.
1901 - 1905	50,7	39,4	45 »	54,3	43,3	49 »	102 »	86,5	94,7	151 »	126 »	138 »
1909 - 1913	49,2	39,1	43,3	45 »	35,5	40,3	90,3	76,5	83,5	131 »	109 »	120 »
1920 - 1924	43,4	34,7	39,7	40,3	31,6	36 »	69,5	56,8	63,3	107 »	87 »	97 »
1925 - 1929	39,3	30,1	34,9	34,7	26,9	30,9	68,7	55,8	62,7	101 »	81 »	91,5
1930 - 1934	38,5	28,6	33,6	30,2	23,7	27 »	55,2	43,7	49,3	83,5	65,8	75,3
1935	37,5	28,5	33,1	28,1	22 »	25,1	50,8	39,2	45 »	77,8	60,2	68,7

TABLEAU II. — Mortalité néonatale enregistrée de 1933 à 1935. — Décès de 0 à 30 jours.

Sexe masculin.

DÉPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	NAISSANCES VIVANTES 1934	NAISSANCES VIVANTES 1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1933	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1934	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1935	DÉCÈS 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION DE CES DÉCÈS pour 1.000 naissances vivantes (moyenne annuelle).
Ain	2.475	2.382	2.269	7.126	55	60	81	196	27,5
Aisne	4.604	4.689	4.297	13.590	121	151	117	389	28,6
Allier	2.552	2 479	2.506	7.537	68	62	56	186	24,7
Alpes (Basses-)	607	505	571	1.683	11	10	10	31	18,4
Alpes (Hautes-)	759	750	662	2.171	15	25	21	61	28.1
Alpes Maritimes	3.151	3.096	2.968	9.215	69	57	48	174	18,9
Ardèche	2.282	2.254	2.082	6.618	77	80	69	226	34,1
Ardennes	2.735	2.848	2.636	8.219	88	66	69	223	27,1
Ariège	1.001	996	889	2.886	24	32	22	78	27.0
Aube	2.064	2.144	2.005	6.213	47	48	48	143	23,0
Aude	2.176	2.088	1.996	6.260	42	52	59	153	24.4
Aveyron	2.559	2.671	2.548	7.778	97	95	100	292	37,5
Belfort (Territoire de)	921	938	892	2.751	17	13	19	49	17,8
Bouches-du-Rhône	7.115	6.965	6.377	20.457	152	150	131	433	21,2
Calvados	4,206	4.229	3.933	12.368	135	133	146	414	33,3
Cantal	1.713	1.651	1.611	4.975	74	94	72	240	48,2
Charente	2.535	2.746	2.496	7.777	77	83	93	253	32,5
Charente-Inférieure	3.604	3.550	3.429	10.583	108	101	91	300	28,3
Cher	1.987	1.982	1.912	5.881	70	49	46	165	28,1
Corrèze	1.906	1.943	1.800	5.649	77	79	70	226	40,0
Corse	1.840	1.843	1.810	5.493	56	62	60	178	32,4
Côte-d'Or	2.796	2.708	2.542	8.046	65	67	60	192	23,9
Côte-du-Nord	5.304	5.313	4.895	15.512	241	275	227	743	48,0
Creuse	1.377	1.461	1.238	4.079	40	49	43	132	32,4
Dordogne	3.041	3.019	2.948	9.008	104	111	101	316	35.0
Doubs	2.808	2.823	2.700	8.331	74	79	70	223	26,8
Drôme	1.909	1.916	1.894	5.719	62	49	49	160	27,9
Eure	2.933	2.869	2.716	8.518	95	100	86	281	33,0
Eure-et-Loir	2.250	2.313	2.244	6.807	76	55	58	189	27,7
Finistère	7.176	7.328	7.132	21.636	236	232	215	683	31,6
Gard	2.730	2.668	2.568	7.966	79	79	67	225	28,2
Garonne (Haute-)	3.125	3.297	3.100	9.522	87	73	83	243	25,5

TABLEAU II (suite). — *Mortalité néonatale enregistrée de 1933 à 1935. — Décès de 0 à 30 jours.*

Sexe masculin.

DÉPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	1934	1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1933	1934	1935	DÉCÈS 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION DE CES DÉCÈS pour 1.000 naissances vivantes (moyenne annuelle).
Gers	1.427	1 411	1.285	4.123	55	41	46	142	34,4
Gironde	6 121	5.991	5.754	17.866	139	122	122	383	21.4
Hérault	3.487	3.411	3.134	10.032	83	87	71	241	24.1
Ille-et-Vilaine	5.718	5.646	5 179	16.543	231	228	212	671	40.7
Indre	1.827	1.876	1.823	5.526	54	53	71	178	32,2
Indre-et Loire	2.884	3 016	2.889	8.789	73	87	68	228	25,9
Isère	4.352	4.296	4.027	12.675	105	103	100	308	24,2
Jura	1.858	1.769	1.737	5.364	45	47	51	143	26,7
Landes	1.850	1.763	1.668	5.281	51	44	41	136	25,8
Loir-et-Cher	2.071	2.068	2 015	6.154	48	58	45	151	24,5
Loire	5.069	4.957	4.629	14.655	154	129	112	395	26,9
Loire (Haute-)	2.092	2.030	1.961	6.083	77	79	90	246	40,5
Loire-Inférieure	5.819	5.697	5 388	16.904	211	164	138	513	30,4
Loiret	2.773	2 845	2.738	8.356	93	67	59	219	26,2
Lot	1.115	1.100	1.066	3.281	32	35	50	117	35,7
Lot-et-Garonne	1.902	1.855	1.809	5.566	42	48	51	141	25,3
Lozère	812	861	751	2.424	36	38	37	111	45,9
Maine-et-Loire	4.373	4.383	4.245	13.001	120	124	106	350	26,9
Manche	4.718	4.914	4.651	14.283	194	172	156	522	36,5
Marne	3.853	3.909	3.700	11.462	119	90	71	280	24,4
Marne (Haute)	1.699	1 732	1.605	5.036	61	52	44	157	31,2
Mayenne	2.681	2.607	2.511	7.799	97	70	73	240	30,8
Meurthe-et-Moselle	5 879	5 931	5.293	17.103	166	132	132	430	25,2
Meuse	1.957	2.021	1.999	5.977	59	59	64	182	30,4
Morbihan	5.866	5.989	5.395	17.250	260	257	226	743	43,0
Moselle	6.944	6.866	6.569	20.379	220	225	200	645	31,6
Nièvre	1.741	1.802	1.701	5.244	49	44	50	143	27,3
Nord	18.151	18.196	17.113	53.460	519	471	406	1.396	26,2
Oise	3.792	3.801	3.508	11.101	119	78	93	290	26,1
Orne	2.651	2.812	2.491	7.954	93	101	91	285	35,9
Pas-de-Calais	13.058	13.091	11.860	38.009	411	418	335	1.164	30,5
Puy-de-Dôme	3.460	3.397	3.270	10.127	94	96	94	284	28,1

TABLEAU II (suite). — *Mortalité néonatale enregistrée de 1933 à 1935. — Décès de 0 à 30 jours.*

Sexe masculin.

DEPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	1934	1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1933	1934	1935	DECES 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION DE CES DÉCÈS pour 1.000 naissances vivantes. (moyenne annuelle).
Pyrénées (Basses-)	3.377	3.550	3,301	10.228	109	120	103	332	32,6
Pyrénées (Hautes-)	1 427	1.396	1.369	4.192	35	37	55	127	30,3
Pyrénées (Orientales)	1.538	1.448	1.453	4.439	38	37	28	103	23,2
Rhin (Bas-)	6.283	6.418	6.219	18.920	182	178	209	569	30,1
Rhin (Haut-)	4.141	4.289	3.933	12.363	108	98	111	317	25,6
Rhône	7.347	7.220	6.859	21.426	184	209	175	568	26,5
Saône (Haute-)	1.808	1.797	1.778	5.383	54	6	50	167	31 »
Saône-et-Loire	4.202	4.251	3.964	12.417	98	115	106	319	25,7
Sarthe	3.895	3.983	3.912	11.790	117	130	134	381	32,3
Savoie	2.057	2.070	1.888	6.015	72	62	60	194	32,2
Savoie (Haute-)	2.080	2.149	2.083	6.312	60	65	72	197	31,2
Seine	35.337	34.861	32.599	102.797	1.150	1.037	845	3.032	29,4
Seine-Inférieure	9.067	9.164	8.742	26.973	277	265	228	770	28,5
Seine-et-Marne	3.310	3.252	2.905	9.467	109	108	78	295	31,1
Seine-et-Oise	9.684	9.218	8.919	27,821	259	233	204	696	25 »
Sèvres (Deux-)	2.925	2.990	2.853	8,768	104	90	83	277	31,5
Somme	4.205	4.363	4.211	12.779	126	117	122	365	28,5
Tarn	2.305	2.220	2.084	6.609	60	71	60	191	28,8
Tarn-et-Garonne	1.267	1.296	1.174	3.737	31	57	35	123	32,9
Var	2.657	2.731	2.521	7.909	73	69	50	192	24,2
Vaucluse	1.935	1.930	1.836	5.701	40	42	31	113	19,8
Vendée	4.070	4.022	3.964	12.056	122	128	109	359	29,6
Vienne	2.647	2.686	2.594	7.927	76	62	73	211	26,7
Vienne (Haute-)	2 503	2.533	2.409	7.445	57	57	70	184	24,7
Vosges	3.439	3.461	3.474	10.374	87	97	109	293	28,2
Yonne	2.004	1.972	1.866	5.842	48	57	47	152	26,1
FRANCE ENTIÈRE	*345.751*	*345.780*	*326.340*	*1.017.871*	*10.425*	*10.094*	*9.259*	*29.758*	*29,2*

TABLEAU III. — Mortalité néonatale enregistrée de 1901 à 1935. – Décès de 0 à 30 jours.

Sexe féminin.

DEPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	NAISSANCES VIVANTES 1934	NAISSANCES VIVANTES 1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCES DE 0 A 30 JOURS 1933	DÉCES DE 0 A 30 JOURS 1934	DÉCES DE 0 A 30 JOURS 1935	DÉCES 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION de ces décès pour 1.000 naissances vivantes (moyenne annuelle).
Ain	2.365	2.220	2.238	6.823	51	42	44	137	20,1
Aisne	4.574	4.457	4.395	13.426	95	92	105	292	21,8
Allier	2.489	2.468	2.354	7.311	45	52	46	143	19,5
Alpes (Basses-)	535	539	501	1.575	8	11	9	28	17,7
Alpes (Hautes-)	695	738	703	2.136	15	27	17	59	27,6
Alpes-Maritimes	3.035	3.033	2.773	8.841	54	41	35	130	14,7
Ardèche	2.205	2.118	2.039	6.362	63	45	59	167	26,2
Ardennes	2.595	2.740	2.602	7.937	45	53	52	150	18,9
Ariège	920	934	917	2.771	19	34	14	67	24,2
Aube	1.963	2.055	1.946	5.964	36	41	42	119	19,9
Aude	2.109	2.094	1.971	6.174	50	41	40	131	21,2
Aveyron	2.595	2.608	2.450	7.653	72	82	72	226	29,6
Belfort (Territoire de)	857	844	805	2.506	16	15	12	43	17,1
Bouches-du-Rhône	6.853	6.658	6.341	19.852	121	83	91	295	14,8
Calvados	3.945	4.184	3.916	12.045	114	105	94	313	26,1
Cantal	1.748	1.688	1.568	5.004	78	55	56	189	37,8
Charente	2.557	2.428	2.401	7.386	53	41	61	155	21,0
Charente-Inférieure	3.487	3.390	3.275	10.152	83	65	78	226	22,2
Cher	1.958	1.872	1.845	5.675	45	48	38	131	23,1
Corrèze	1.904	1.865	1.804	5.573	58	63	62	183	32,8
Corse	1.830	1.733	1.765	5.328	41	48	35	124	23,3
Côte-d'Or	2.671	2.589	2.549	7.809	46	43	47	136	17,4
Côtes-du-Nord	5.141	5.036	4.821	14.998	197	198	149	544	36,3
Creuse	1.320	1.298	1.238	3.856	36	28	36	100	26,0
Dordogne	2.887	2.950	2.782	8.619	76	73	81	230	26,7
Doubs	2.796	2.753	2.599	8.148	58	63	65	186	22,8
Drôme	1.874	1.819	1.782	5.475	27	38	33	98	17,8
Eure	2.770	2.856	2.738	8.364	79	69	58	206	24,7
Eure-et-Loire	2.187	2.335	2.136	6.658	43	44	34	121	18,2
Finistère	6.945	7.056	6.765	20.766	174	147	145	466	22,4
Gard	2.584	2.592	2.451	7.627	70	57	54	181	23,7
Garonne (Haute)	3.078	3.143	3.040	9.261	79	70	76	225	24,3

TABLEAU III (suite). — *Mortalité néonatale enregistrée de 1933 à 1935. — Décès de 0 à 30 jours.*

Sexe féminin.

DEPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	1934	1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1933	1934	1935	DÉCÈS 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION de ces décès pour 1.000 naissances vivantes (moyenne annuelle)
Gers	1.409	1.263	1 280	3.952	37	33	26	96	24,3
Gironde	5.904	5.928	5.515	17.347	112	95	97	304	17,6
Hérault	3.353	3 349	3,103	9.805	58	65	56	179	18,3
Ille-et-Vilaine	5.395	5.504	5.148	16.047	169	158	168	495	31,0
Indre	1.770	1.868	1.845	5.483	29	43	50	122	22,3
Indre et-Loire	2.752	2.808	2.708	8.268	56	68	46	170	20,6
Isère	4.265	4.101	3.839	12.205	82	57	80	219	18,0
Jura	1.815	1·743	1.649	5.207	46	33	37	116	22,3
Landes	1.725	1.784	1.730	5.239	38	40	38	116	22,2
Loir-et-Cher	1.993	2.042	1.844	5.879	38	44	27	109	18,5
Loire	4.876	4.763	4.585	14.224	89	111	91	291	20,5
Loire (Haute-)	1.965	1.960	1.857	5.782	63	59	65	187	32,4
Loire-Inférieure	5.533	5.505	5.185	16.223	152	156	86	394	24,3
Loiret	2.650	2.761	2.512	7·923	52	56	50	158	19,9
Lot	1.114	1.070	1.050	3.234	50	23	27	100	31,0
Lot-et-Garonne	1.737	1.811	1.739	5.287	5	37	41	123	23,3
Lozère	760	792	745	2.297	22	26	27	75	32,6
Maine-et-Loire	4.163	4 230	4.104	12.497	87	83	87	257	20,5
Manche	4.593	4.719	4.452	13.764	134	130	102	366	26,5
Marne	3.613	3.751	3.554	10.918	77	55	68	200	18,4
Marne (Haute-)	1.655	1.666	1.598	4.919	48	38	33	119	24,2
Mayenne	2.651	2.526	2.455	7.632	78	69	71	218	28,6
Meurthe-et-Moselle	5.574	5.527	5.163	16.264	108	90	102	300	18,4
Meuse	2.010	1.905	1.927	5.842	55	44	39	138	23,6
Morbihan	5.756	5.643	5 299	16.698	174	169	153	496	29,7
Moselle	6.611	6.497	6.100	19.208	170	192	180	542	28,2
Nièvre	1.706	1.671	1.639	5.016	30	38	33	101	20,1
Nord	17.590	17.699	16.107	51.396	411	402	356	1.169	22,8
Oise	3.596	3.735	3.440	10.771	82	90	66	238	22,0
Orne	2.519	2 612	2.417	7.548	61	71	54	186	24,6
Pas-de-Calais	12.547	12.510	11.558	36.615	312	280	251	843	23,0
Puy-de-Dôme	3.392	3.438	3.158	9.988	91	65	68	224	22,4

TABLEAU III (suite). — *Mortalité néonatale enregistrée de 1901 à 1935.— Décès de 0 à 30 jours*.

Sexe féminin.

DÉPARTEMENTS	NAISSANCES VIVANTES 1933	1934	1935	NAISSANCES 1933-1935	DÉCÈS DE 0 A 30 JOURS 1933	1934	1935	DÉCÈS 0 à 30 jours 1933-1935	PROPORTION de ces décès pour 1.000 naissances vivantes (moyenne annuelle)
Pyrénées (Basses-)	3.251	3.320	3.123	9.694	85	94	91	270	27,9
Pyrénées (Hautes-)	1.357	1.387	1.329	4.073	30	33	32	95	23,4
Pyrénées-Orientales	1.498	1.418	1.350	4.266	32	24	28	84	19,7
Rhin (Bas-)	6.138	6.217	5.830	18.185	141	156	155	452	24,8
Rhin (Haut-)	3.934	4.308	3.789	12.031	82	77	79	238	19,9
Rhône	6.967	6.852	6.454	20.273	132	117	111	360	17,8
Saône	1.729	1.771	1.711	5.211	36	39	45	120	23,0
Saône-et-Loire	4.036	4 005	3.784	11.825	75	71	81	227	19,3
Sarthe	3.682	3.813	3.683	11.178	94	83	85	262	23,4
Savoie	1.977	1.890	1.886	5.753	54	46	45	145	25,2
Savoie (Haute-)	2.180	2.108	2.102	6.390	52	52	50	154	24,1
Seine	34.235	33.122	30.995	98.352	929	872	638	2.439	24,8
Seine-Inférieure	8.655	8.854	8.293	25.802	222	190	181	593	23,0
Seine-et-Marne	3.167	.120	2.932	9.219	71	67	57	195	21,2
Seine-et-Oise	9.116	8.830	8.440	26.386	192	157	177	526	19,9
Sèvres (Deux-)	2.715	2.824	2.792	8.331	61	65	63	189	22,7
Somme	4.088	4.104	3.937	12.129	109	100	100	309	25,6
Tarn	2.204	2.125	2.001	6.330	52	53	43	148	23,4
Tarn-et-Garonne	1.217	1.282	1.134	3.633	42	30	24	96	26,4
Var	2.518	2.627	2.487	7.632	50	59	37	146	19,1
Vaucluse	1.903	1.808	1.808	5.519	41	30	21	92	16,7
Vendée	3.811	3.786	3.794	11 391	86	74	76	236	20,7
Vienne	2.431	2.491	2.413	7.335	43	51	51	145	19,8
Vienne (Haute-)	2.424	2.428	2.228	7.080	47	51	26	124	17,5
Vosges	3.319	3.385	3.255	9.959	71	70	70	211	21,1
Yonne	1.933	1.949	1.822	5.704	40	37	31	108	19,0
FRANCE ENTIÈRE	*332.949*	*332.098*	*314.187*	*979.234*	*7.962*	*7.522*	*6.902*	*23.386*	*23,9*

TABLEAU IV. — Diminution du taux de la mortalité nationale de 1901-1905 à 1933-1935.

Décès de 0 à 30 jours pour 1000 naissances vivantes de sexe correspondant.

DÉPARTEMENTS	GARÇONS			FILLES		
	1901-1905	1933-1935	Diminution en %	1901-1905	1933-1935	Diminution en %
Ain	52 3	27.5	47,4	44,5	20,1	54,8
Aisne	53,9	28,6	47,0	39,9	21,8	45,3
Allier	37,5	24,7	34,2	30,8	19,5	36,7
Alpes (Basses)	65,0	18,4	71,7	47.9	17,7	63,1
Alpes (Hautes)	58,7	28,1	52,1	41,9	27,6	34,2
Alpes-Maritimes	63,2	18,9	70,0	53,8	14,7	72,7
Ardèche	80.3	34,1	57,5	66,2	26,2	60,4
Ardennes	48,6	27,1	44,2	37,3	18,9	49,3
Ariège	52,7	27,0	48,8	39,9	24,2	39,4
Aube	51,3	23,0	55,0	42,1	19,9	52,8
Aude	55,9	24,4	56,4	44,8	21,2	52,7
Aveyron	74,0	37,5	49,3	58,7	29,6	49,7
Belfort (Ter. de)	55,7	17,8	68,0	42,3	17,1	59,5
Bouches-du-Rhône	65,6	21,2	67,4	54,3	14,8	72,8
Calvados	54,9	33,3	39,3	44,8	26,1	41,7
Cantal	69,0	48,2	30,1	56,4	37,8	33,0
Charente	50,7	32,5	35,9	36,4	21,0	42,2
Charente-Inférieure	51,7	28,3	45,3	41,0	22,2	45,9
Cher	53,7	28,1	47,7	41,6	23,1	44,5
Corrèze	66,3	40,0	39,7	55,5	32,8	40,9
Corse	45,0	32,4	28,0	35,0	23,3	33,4
Côte d'Or	48,3	23,9	50,5	40,3	17,4	56,8
Côtes du Nord	73,5	48,0	34,7	58,3	36,3	37,8
Creuse	42.5	32,4	23,8	32,5	26,0	20,0
Dordogne	55,8	35,0	37,3	44,7	26,7	40,3
Doubs	66,7	26,8	59,7	50,7	22,8	55,1
Drôme	54,1	27,9	48,4	43,3	17,8	58,9
Eure	59,2	33,0	44,2	46,0	24,7	46,3
Eure-et-Loir	60,9	27,7	54.6	41,9	18,2	56,5
Finistère	51,7	31,6	38,9	40,2	22,4	44,2
Gard	55,9	28,2	49,5	43,2	23,7	45,2
Garonne (Haute)	52,0	25,5	51,0	49,0	24,3	50,3

TABLEAU IV. — Diminution du taux de la mortalité nationale de 1901-1905 à 1933-1935.

Décès de 0 à 30 jours pour 1000 naissances vivantes de sexe correspondant.

DÉPARTEMENTS	GARÇONS			FILLES		
	1901-1905	1933-1935	Diminution en %	1901-1905	1933-1935	Diminution en %
Gers	52,2	34,4	34,1	42,7	24,3	43,1
Gironde	41,0	21,4	47,8	33,7	17,6	47,8
Hérault	51,1	24.1	52,7	39,0	18,3	53,1
Ille-et-Vilaine	64,9	40,7	37,3	49,4	31,0	37,3
Indre	49,5	32,2	35,0	37,0	22,3	39,8
Indre-et-Loire	46,6	25,9	44,4	38,3	20,6	46,2
Isère	49,3	24,2	50,9	40,7	18,0	55,8
Jura	53,3	26,7	50,0	44,3	22,3	49,8
Landes	41,1	25,8	37,2	35,6	22,2	37,6
Loir-et-Cher	53,6	24,5	54,3	43,1	18,5	57,1
Loire	60,0	26,9	55,2	49,3	20.5	58,4
Loire (Haute-)	93,0	40,5	56,4	76,5	32,4	57,7
Loire-Inférieure	41,9	30,4	27,5	32,5	24,3	25,2
Loiret	47,7	26,2	45,0	38,7	19,9	48,7
Lot	74,7	35,7	52,2	57.2	31,0	45,8
Lot-et-Garonne	59,0	25,3	57,1	50,0	23,3	53,4
Lozère	76,5	45,9	40,0	62.7	32,6	48,0
Maine-et-Loire	49,7	26,9	45,9	34,6	20,5	40,8
Manche	52,5	36,5	30,5	38,4	26,5	31,0
Marne	46,5	24,4	47,6	38,3	18,4	52,0
Marne (Haute-)	57,3	31,2	45,6	43,7	24,2	44,6
Mayenne	54,0	30,8	43,0	39,5	28,6	27,6
Meurthe-et-Moselle	50,3	25,2	49,8	43,4	18,4	57,7
Meuse	59,4	30,4	48,9	46,2	23,6	49,0
Morbihan	61,7	43,0	30,3	48,4	29,7	38,6
Moselle	»	31,6	»	»	28,2	»
Nièvre	48,0	27,3	43,2	35,4	20,1	43,2
Nord	50,7	26,2	48,3	38,9	22,8	41,4
Oise	49,1	26,1	46,8	37,8	22,0	41,8
Orne	67,3	35,9	46,7	50,1	24,6	51,0
Pas de Calais	40,7	30,5	25,1	32,8	23,0	29,8
Puy-de-Dôme	53,7	28,1	47,7	40,3	22,4	44,3

TABLEAU IV. — Diminution du taux de la mortalité nationale de 1901-1905 à 1933-1935.

Décès de 0 à 30 jours pour 100) naissances vivantes de sexe correspondant.

DÉPARTEMENTS	GARÇONS			FILLES		
	1901-1905	1933-1935	Diminution en %	1901-1905	1933-1935	Diminution en %
Pyrénées (Basses-)	58,4	32,6	44,2	46,7	27,9	40,3
Pyrénées (Hautes-)	54,4	30,3	44,3	40,2	23,4	41,8
Pyrénées (Orientales-)	52,1	23,2	55,3	40,9	19,7	51,8
Rhin (Bas-)	»	30,1	»	»	24,8	»
Rhin (Haut-)	»	25,6	»	»	19,9	»
Rhône	50,8	26,5	47,9	40,7	17,8	56,2
Saône (Haute-)	67,2	31,0	53,9	49,6	23,0	53,5
Saône-et-Loire	50,0	25,7	48,7	36,1	19,3	46,5
Sarthe	57,5	32,3	43,8	46,8	23,4	50,0
Savoie	60,0	32,2	46,3	49,3	25,2	48,9
Savoie (Haute-)	46,8	31,2	33,4	41,5	24,1	41,9
Seine	54,2	29,4	45,7	47,7	24,8	48,0
Seine-Inférieure	55,9	28,5	49,0	45,9	23,0	49,9
Seine-et-Marne	55,7	31,1	44,2	43,4	21,2	51,2
Seine-et-Oise	44,2	25.0	43,5	37,3	19,9	46,6
Sèvres (Deux-)	52,4	31,5	39,9	35,5	22,7	36,1
Somme	56,0	28,5	49,1	43,5	25,6	41,2
Tarn	61,6	28,8	53,2	44,5	23,4	47,4
Tarn-et-Garonne	66,5	32,9	50,6	52,0	26,4	49,2
Var	49,7	24,2	51,2	44,3	19,1	56,8
Vaucluse	47,0	19,8	58,0	35,3	16,7	52,7
Vendée	45,4	29,6	34,9	35,1	20,7	41,0
Vienne	44,8	26,7	40,3	33,2	19,8	40,3
Vienne (Haute-)	51,5	24,7	52,0	36,5	17,5	52,0
Vosges	58,6	28,2	51,9	42,7	21,1	50,7
Yonne	47,2	26,1	44,7	35,0	19,0	45,8
FRANCE ENTIÈRE	*54,3*	*29,2*	*46,2*	*43,3*	*23,9*	*44,8*

CHAPITRE VI

MORTALITÉ DE L'ENFANT DE 1 à 15 ANS.

Le but de ce chapitre est de démontrer que, parallèlement au déclin de la mortalité de l'enfant de 0 à 1 an, les générations âgées de 1 à 15 ans ont, elles aussi, eu le privilège de bénéficier des efforts faits en faveur de la mortalité précoce et de réfuter ainsi les croyances admises dans certains milieux. En effet, on exprime trop souvent la crainte que la forte réduction de la mortalité des nouveau-nés, en éliminant la sélection naturelle, doivent obligatoirement entraîner une stabilité, sinon une augmentation du risque chez les enfants ayant dépassé leur première année de vie. Il n'en est heureusement rien, comme nous allons en juger, grâce aux commentaires des tableaux I et II. Ces derniers opposent, en effet, dans chaque sexe et pour chacun de nos départements, la mortalité enregistrée en 1901, et de 1930 à 1932, chez les enfants de 1 à 4 ans, de 5 à 9 ans et de 10 à 14 ans.

Avant de passer à un examen plus détaillé, il est d'ores et déjà intéressant de constater que pour l'ensemble du pays :

La réduction du risque mortalité atteint chez les enfants de 1 à 4 ans 58,5 % chez les garçons, et 59,7 % chez les filles.

Chez ceux âgés de 5 à 9 ans, elle correspond respectivement à 52,1 % et 55,2 %.

De 10 à 14 ans, elle est de 38,7 % pour le sexe masculin, et de 42,8 % pour le sexe féminin.

Ce sont là les démentis les plus formels que l'on puisse opposer aux esprits trop pessimistes.

Voyons maintenant la situation faite à nos départements :

Chez les garçons de 1 à 4 ans, la diminution a été générale entre les taux de 1901 et ceux de 1930-1932. Cependant, elle oscille de 22,3 % dans le Tarn-et-Garonne, 31,4 % dans la Côte-d'Or, 36,2 % dans la Haute-Marne, 38,0 % dans les Ardennes et le Doubs, 39,0 % en Meurthe-et-Moselle, 39.7 % dans le Calvados, à 81,0 % dans les Bouches-du-Rhône, 73,7 % dans la Lozère, 73,0 % dans les Alpes-Maritimes, 71,5 % dans l'Hérault, 71,3 dans le territoire de Belfort, etc. L'on peut ainsi juger de l'inégalité qui existe là encore devant la mort. Il est cependant utile de préciser que la Meurthe-et-Moselle avec 103 décès de cet âge pour 10.000 enfants, la Seine-Inférieure avec 100, le Calvados avec 91, détiennent les maxima, tandis que l'Indre avec 39 décès pour 10.000 garçons de même âge, la Creuse avec 40, le Cher avec 42, les Deux-Sèvres avec 44, la Nièvre avec 45 revendiquent les minima. Ainsi, quand il meurt 100 jeunes garçons en certains endroits, il en décède 250 dans d'autres.

Chez les 5 à 9 ans, les taux les plus faibles s'observent dans l'Aube, la Creuse, le Loir-et-Cher, les Deux-Sèvres et la Vienne avec 14 décès pour 10.000 enfants de cet âge, tandis

que les coefficients les plus élevés se rencontrent en Meurthe-et-Moselle et dans la Savoie avec 32 décès pour 10.000, dans le Calvados et dans le Morbihan avec 30 décès pour 10.000. C'est dans le Jura que la diminution a été la plus sensible (76,2 °/₀) ; c'est dans la Côte-d'Or qu'elle a été la plus faible (16,0 °/₀).

Chez les 10 à 14 ans, on trouve 6 variations positives; elles sont regrettables, mais non inquiétantes, parce qu'elles paraissent subordonnées non à la gravité des coefficients actuels, qui demeurent comparables à beaucoup d'autres, mais plutôt au faible risque relevé en 1901 qui, sans être inexact, peut être influencé par les lois du hasard. N'oublions pas qu'il s'agit d'une seule année et de petits effectifs.

Cette considération, non plus que l'examen du tableau II pour le sexe féminin, qui fait connaître des déductions similaires à celles que nous venons d'exposer pour le sexe masculin, ne sauraient ôter à nos conclusions la part d'optimisme qui devait être acquise dans ce chapitre au sujet de l'heureuse évolution de la mortalité des enfants de 1 à 14 ans.

Tableau I. — Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe masculin). — Proportion pour 10.000 enfants d'âge correspondant.

DÉPARTEMENTS	1 a 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	1901	1930-1932	Diminution en °/₀ de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en °/₀ de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en °/₀ de 1901 à 1930 1932
Ain	115	50	56,5	46	19	58,7	32	20	37,5
Aisne	142	58	59,1	41	20	51,2	23	22	4,3
Allier	94	48	49,0	39	15	61,7	25	20	20,0
Alpes (Basses-)	183	82	55,2	40	22	45,0	43	16	62,7
Alpes (Hautes-)	185	81	56,3	36	18	50,0	41	30	26,8
Alpes Maritimes	263	71	73,0	60	24	60,0	38	10	73,7
Ardèche	215	72	66,7	54	26	51,8	34	15	55,9
Ardennes	108	67	38,0	33	25	24,2	17	20	+ 17,6
Ariège	137	56	59,1	46	16	65,2	32	23	28,1
Aube	128	50	60,9	37	14	62,1	16	18	+ 12,5
Aude	209	77	63,3	53	18	66,0	24	18	25,0
Aveyron	197	69	65,0	45	17	62,3	30	21	30,0
Belfort (Ter. de Belfort)	212	61	71,3	51	29	43,1	15	24	+ 60,0
Bouches-du-Rhône	395	75	81,0	64	21	67,2	46	16	65,3
Calvados	151	91	39,7	59	30	49,3	35	22	37,2
Cantal	113	62	45,2	40	17	57,7	27	15	44,5
Charente	118	49	58,5	37	15	59,3	30	16	46,7
Charente Inférieure	129	56	56,5	47	20	57,5	41	18	56,1
Cher	86	42	51,1	53	19	64,1	29	17	41,4
Corrèze	121	52	57,0	46	17	63,0	23	15	34,7
Corse	248	82	67,0	78	20	74,5	44	11	75,0
Côte-d'Or	89	61	31,4	25	21	16,0	25	12	52,0
Côtes-du-Nord	115	69	40,0	59	24	59,5	39	22	43,7
Creuse	110	40	63,5	28	14	50,0	27	11	59,3
Dordogne	178	53	70,3	43	16	62,8	22	16	27,2
Doubs	121	75	38,0	43	20	53,5	37	20	45,9
Drôme	192	59	69.3	53	17	68,0	37	17	54,1
Eure	129	63	51,1	38	25	34,3	43	20	53,6
Eure-et-Loir	167	59	64,7	54	17	68,5	32	19	40,7
Finistère	178	70	60,7	63	26	58,7	40	22	45,0
Gard	276	86	68,9	51	22	56,9	41	17	58,5
Garonne (Haute-)	143	80	44,0	55	26	52,7	33	18	45,5

Tableau I (suite). — *Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe masculin).* — Proportion pour 10.000 enfants d'âge correspondant.

DÉPARTEMENTS	1 à 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932
Gers	128	47	63,3	30	15	50,0	24	21	12,5
Gironde	133	73	44,8	35	21	40,0	25	18	28,0
Hérault	287	82	71.5	53	23	56,7	35	18	48,7
Ille-et-Vilaine	148	77	48,0	65	28	53,8	45	21	53,4
Indre	115	39	66,1	30	20	33,3	17	20	+ 17,6
Indre-et-Loire	117	62	47,0	40	21	47.5	22	18	18,2
Isère	153	72	53,0	37	22	40,5	23	21	8,7
Jura	152	55	63,7	63	15	76,2	27	15	44,5
Landes	96	52	45,8	37	25	32,4	31	19	38,7
Loir-et-Cher	120	54	55,0	32	14	56,3	30	20	33,3
Loire	155	69	55,5	46	20	56,5	29	20	31,1
Loire (Haute-)	150	76	49,3	62	19	69,3	37	17	54,1
Loire-Inférieure	131	57	56,5	36	23	36,2	31	24	22,5
Loiret	122	57	53,3	32	20	37,5	29	18	38,0
Lot	156	67	57,0	69	21	69,5	50	11	78,0
Lot-et-Garonne	110	56	49,1	67	23	65,7	44	16	63,7
Lozère	224	59	73,7	30	19	36,7	30	14	53,3
Maine-et-Loire	125	57	54,4	36	17	52,8	31	20	35,5
Manche	149	69	53,7	46	27	41,3	30	22	26,6
Marne	183	76	58,5	37	23	37,9	26	14	46,2
Marne (Haute-)	94	60	36,2	43	23	46,5	18	18	»
Mayenne	139	51	63,3	47	23	51,1	32	17	46,9
Meurthe-et-Moselle	169	103	39,0	45	32	29,0	29	26	10,3
Meuse	145	77	46,8	34	19	44,2	32	17	46,9
Morbihan	175	76	56,5	46	30	34,8	28	18	35.7
Moselle	»	71	»	»	24	»	»	17	»
Nièvre	105	45	57,1	40	16	60,0	26	17	34,6
Nord	174	74	57,4	47	24	49,0	25	19	24,0
Oise	143	59	58,7	33	20	39,5	40	19	52,5
Orne	135	72	46,7	40	22	45,0	23	19	17,4
Pas-de-Calais	193	88	54,5	47	28	40,4	27	22	18,5
Puy-de-Dôme	135	53	60,7	43	17	60,5	26	18	30,8

Tableau I (Fin). — *Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe masculin).* — Proportion pour 10.000 enfants d'âge correspondant.

DÉPARTEMENTS	1 à 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932
Pyrénées (Basses-)	132	62	53,0	40	21	47,5	21	18	14,3
Pyrénées (Hautes-)	153	61	60,1	50	29	42,0	43	18	58,1
Pyrénées-Orientales	239	75	68,7	50	18	64,0	40	15	62,5
Rhin (Bas-)	»	65	»	»	29	»	»	18	»
Rhin (Haut-)	»	54	»	»	24	»	»	17	»
Rhône	158	54	65,8	52	16	69,3	24	15	37,5
Saône (Haute-)	152	60	60,6	44	18	59,0	30	23	23,3
Saône-et-Loire	124	55	55,7	50	17	66,0	33	18	45,5
Sarthe	160	70	56,2	40	20	50,0	24	21	12,5
Savoie	149	68	54,3	62	32	48,4	34	30	11,8
Savoie (Haute-)	162	63	60,4	49	23	53,1	33	26	21,2
Seine	278	97	65,2	68	29	57,3	38	21	44,8
Seine-Inférieure	186	100	46,2	50	27	46,0	27	18	33.3
Seine-et-Marne	127	61	52,0	34	21	38,2	16	20	+ 25,0
Seine-et-Oise	176	62	64,7	46	24	47,8	30	19	36,7
Sèvres (Deux-)	130	44	66,1	42	14	66,7	28	12	57,2
Somme	143	65	54,5	38	24	36,9	26	17	34,6
Tarn	150	70	53,4	33	19	42,3	29	17	41.4
Tarn-et-Garonne	103	80	22,3	45	20	55,5	34	21	38,3
Var	254	78	69,3	67	25	62,6	28	20	28,5
Vaucluse	225	89	60,4	41	26	36,7	28	29	+ 3,6
Vendée	109	53	51.3	35	17	51,5	32	16	50,0
Viennne	127	47	63,0	51	14	72,5	37	15	59,5
Vienne (Haute-)	133	55	58,7	50	21	58,0	23	17	26,1
Vosges	142	73	48,6	39	17	56,4	23	18	21,7
Yonne	212	53	52,7	39	18	53,9	27	16	40,8
FRANCE ENTIÈRE	169	70	58,5	48	23	52,1	31	19	38,7

Tableau II. — Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe féminin). — Proportion pour 10.000 enfants d'âge correspondant..

DÉPARTEMENTS	1 à 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932
Ain	112	45	59,8	41	15	63,5	31	13	58,1
Aisne	136	53	61,0	41	19	53,7	29	18	38,0
Allier	74	38	48,7	38	20	47,4	27	21	22,2
Alpes (Basses-)	202	69	65,8	56	17	69,7	46	17	63,0
Alpes (Hautes-)	204	65	68,1	44	28	36,4	34	21	38,2
Alpes-Maritimes	222	64	71,2	75	24	68,0	48	20	58,3
Ardèche	210	63	70,0	60	21	65,0	34	15	55,9
Ardennes	117	55	53,0	38	24	36,8	16	21	+ 31,3
Ariège	142	53	62,7	51	17	66,8	31	19	38,7
Aube	105	52	50,5	35	22	37,1	34	18	47,0
Aude	212	75	64,7	51	23	54,9	35	16	54,3
Aveyron	182	66	63,8	54	25	53,7	36	22	38,9
Belfort (Territoire de)	205	62	69,7	77	23	70,1	25	11	56,1
Bouches-du-Rhône	359	85	76,3	74	23	68,9	40	20	50,0
Calvados	160	79	50,7	43	24	44,2	33	21	36,4
Cantal	97	58	40,2	38	20	47,3	25	21	16,0
Charente	107	41	61.6	40	17	57,5	39	17	56,4
Charente Inférieure	119	49	58,8	53	18	66,0	35	21	40,0
Cher	88	36	59,1	36	19	47,3	37	13	64,9
Corrèze	124	42	66,1	54	11	79,8	30	15	50,0
Corse	290	65	77,5	74	20	73,0	49	16	67,3
Côte-d'Or	91	50	45,1	24	17	29,2	24	19	20,8
Côte du-Nord	125	56	55,2	62	24	61,4	51	29	43,1
Creuse	90	32	64,5	32	18	43,7	36	15	58,4
Dordogne	166	44	73,5	46	16	65,2	30	15	50,0
Doubs	134	65	51,4	49	20	59,2	38	18	52,7
Drôme	214	55	69,7	51	16	68,7	40	15	62,5
Eure	115	56	51,2	31	21	32,3	26	17	34,6
Eure-et-Loir	145	54	62,7	35	22	37,2	31	19	38,7
Finistère	198	64	67,7	67	27	59,7	55	26	52,8
Gard	294	69	76,5	53	19	64,2	62	17	72,5
Garonne (Haute-)	136	70	48,5	48	25	48,0	31	17	45,2

Tableau II (Suite). — *Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe féminin).* — Proportion pour 10.000 enfants d'âge correspondant.

DÉPARTEMENTS	1 à 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminutiod en % de 1901 à 1930-1932
Gers	107	42	60,7	38	16	57,9	25	11	56,0
Gironde	126	67	46,8	34	18	47,1	30	16	46,7
Hérault	267	79	70,5	51	21	58,8	38	18	52,7
Ille-et-Vilaine	146	66	54,7	48	27	43,8	39	23	41,0
Indre	98	39	60,2	37	20	46,0	30	13	56,7
Indre-et-Loire	94	63	33,0	30	15	50,0	36	15	58,3
Isère	146	70	52,0	49	19	61,2	36	18	50,0
Jura	162	45	72,2	52	17	67,3	36	22	38,9
Landes	83	47	43,4	37	19	48,7	29	16	44,8
Loir-et-Cher	105	42	60,0	38	16	58.0	19	15	21,0
Loire	141	56	60,3	55	19	65,5	31	16	48,4
Loire (Haute-)	142	53	62,7	64	14	78,2	48	25	48,0
Loire-Inférieure	103	54	47,5	41	24	41,5	29	31	+ 6,9
Loiret	122	56	54,0	32	17	46,9	27	18	33,3
Lot	142	46	67,7	72	17	76.3	53	11	79,3
Lot-et-Garonne	103	47	54,3	41	15	63,5	41	14	65,8
Lozère	191	54	71,8	55	13	76,3	45	21	53,3
Maine-et-Loire	123	47	61,8	37	15	59,5	34	20	41,2
Manche	136	65	52,2	39	25	35,9	32	20	37,5
Marne	157	69	56,0	39	20	48,7	29	17	41,5
Marne (Haute-)	63	53	15,9	27	16	40.8	27	22	18,5
Mayenne	116	55	52,6	49	16	67,4	32	27	15,6
Meurthe-et-Moselle	150	91	39,3	46	26	43,5	26	22	15,4
Meuse	116	69	40,5	33	18	45.5	30	22	26,7
Morbihan	178	72	59,6	53	29	45,2	35	25	28,5
Moselle	»	66	»	»	23	»	»	21	»
Nièvre	98	47	52,1	43	16	62,9	32	15	53,1
Nord	156	65	58,3	46	23	50,0	31	20	35,5
Oise	131	58	55,7	40	23	42,5	40	21	47,5
Orne	122	59	51,7	48	24	50,0	30	18	40,0
Pas-de-Calais	197	79	59,8	46	28	39,2	30	24	20,0
Puy-de-Dôme	130	53	59,2	56	19	66.1	32	20	37,5

Tableau II (Fin). — *Mortalité générale de l'enfant âgé de 1 à 15 ans comparée de 1901 à 1930-32 (sexe féminin).* Pour 10.000 enfants d'âge correspondant.

DÉPARTEMENTS	1 à 4 ans.			5 à 9 ans.			10 à 14 ans.		
	901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932	1901	1930-1932	Diminution en % de 1901 à 1930-1932
Pyrénées (Basses-)	129	64	50,5	34	17	50,0	30	21	30,0
Pyrénées (Hautes-)	125	49	60,7	65	16	75,3	43	24	44,2
Pyrénées-Orientales	261	68	74,0	59	19	67,7	46	13	71,7
Rhin (Bas-)	»	52	»	»	23	»	»	19	»
Rhin (Haut-)	»	46	»	»	20	»	»	21	»
Rhône	152	63	58,5	58	19	67,2	40	20	50,0
Saône (Haute-)	107	51	52,3	50	15	70,0	28	13	53,7
Saône-et-Loire	104	45	56,8	48	16	66,7	38	17	55,3
Sarthe	136	59	56,7	40	22	45,0	26	20	23,1
Savoie	142	78	45,1	53	23	56,6	58	23	60,3
Savoie (Haute-)	158	59	62,7	53	27	49,1	36	25	30,6
Seine	268	92	65,8	69	29	57,8	40	21	47,5
Seine-Inférieure	198	96	51,6	42	25	40,4	29	22	24,1
Seine-et-Marne	117	57	51,3	40	21	47,5	30	18	40,0
Seine-et-Oise	155	58	62,5	49	21	57,2	38	21	44,8
Sèvres (Deux-)	121	42	65,2	45	14	68,8	36	13	63,9
Somme	127	68	46,4	41	23	43,9	31	17	45,2
Tarn	158	67	57,5	40	19	52,6	32	17	46,8
Tarn-et-Garonne	127	55	56,7	36	20	44,5	25	16	36,0
Var	259	75	71,1	71	23	67,5	55	20	63,7
Vaucluse	222	83	62,7	46	24	47,9	43	19	55,8
Vendée	90	52	42,3	38	15	60,5	38	20	47,4
Vienne	124	49	60,5	45	16	64,5	33	14	57,5
Vienne (Haute-)	134	43	67,9	40	17	57,5	36	21	41,7
Vosges	131	66	49,7	43	23	46.5	26	18	30,8
Yonne	107	51	52,3	29	13	55,2	21	19	9.5
FRANCE ENTIÈRE	159	64	59,7	49	22	55,2	35	20	42,8

CHAPITRE VII

MORTALITÉ DE L'ENFANT ASSISTÉ ET DE L'ENFANT PROTÉGÉ comparée à la mortalité de l'enfance générale.

Puisque des études spéciales (1) et très détaillées sont publiées annuellement, malgré de nombreuses difficultés techniques, au sujet de l'enfance protégée (enfants mis en nourrice) et de l'enfance assistée (enfants abandonnés placés sous la tutelle de l'Assistance publique), nous nous bornerons ici à établir un rapprochement d'ensemble sur la mortalité de ces catégories d'enfants. Cette comparaison sera d'ailleurs assez partielle, puisque les termes n'en sont pas identiques en tant que période d'observation.

Quoi qu'il en soit, un rapide examen du tableau I nous apportera les précisions suivantes :

1° Qu'il s'agisse d'enfants protégés ou de l'enfant en général et que les décès surviennent de 0 à 4 jours, de 5 à 9 jours, ... de 30 à 90 jours ou à la fin de la première année, les risques sont plus élevés pour les illégitimes que pour les légitimes. Cependant, de 1926 à 1933 ou 1935, l'écart est moins large, la diminution de la mortalité correspondant à 26,9 °/₀ chez l'enfant légitime de moins d'un an et à 42,1 °/₀ chez l'enfant illégitime. Pour l'enfant protégé, l'opposition est moins nette, cependant que la régression atteint respectivement 46,5 et 57,7 °/₀.

2° En éliminant les données trop incertaines parce que soumises aux lois du hasard, on peut toutefois affirmer que la diminution la plus importante a été réalisée chez les enfants protégés et de toutes catégories sociales âgés de 15 à 29 jours, tandis que l'enfant assisté de 5 à 9 jours a largement bénéficié des efforts réalisés par l'Assistance publique pour améliorer les conditions d'existence des enfants placés sous sa surveillance.

3° Les enfants protégés âgés de 0 à 9 jours apparaissent par ailleurs subir moins de risques que les enfants de toutes catégories et de même âge (enfants qui demeurent sous la surveillance de leurs parents, enfants mis en nourrice et enfants abandonnés réunis). En réalité, il n'en est rien et la remarque que suggère le tableau I trouve sa justification dans le fait que les mises en nourrice se font, d'une manière générale, assez tardivement — il s'agit donc de faibles effectifs — et aussi dans la pratique couramment observée par laquelle le retrait de l'enfant s'opère dès que l'état pathologique devient grave — le décès se produit donc en dehors du domicile de la nourrice.

Ce sont là des objections que nous avons tenu à signaler afin de préciser, autant que possible, les observations essentielles qu'il est permis de dégager de la comparaison des taux de mortalité chez l'enfant protégé, l'enfant assisté et l'enfant de toutes conditions sociales.

(1) Publications du Ministère de la Santé publique — Direction de l'Hygiène et de l'Assistance — Statistique du Service de Protection des enfants du premier âge et Statistique de la mortalité des enfants assistés. — Melun, Imprimerie administrative.

Rapport annuel présenté à l'Académie de Médecine par le Dr Lesage sur l'Hygiène de l'Enfance.

TABLEAU I. — Mortalité comparée des enfants âgés de 0 à 10 ans.

(par petits groupes d'âge),

Enfants au total, enfants protégés et enfants assistés.

(1) Enfance générale de 1926 à 1935 (10 ans). Enfance protégée de 1926 à 1933 (8 ans). Enfance assistée de 1933 à 1935 (3 ans).

ANNÉES		0-4 JOURS			5-9 JOURS			10-14 JOURS			15-29 JOURS			30-90 JOURS			91-180 JOURS			181-364 JOURS			0-365 JOURS		
		ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE GÉNÉRALE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE ASSISTÉE
1926 (2)	Légitimes	2 58	0,38	»	1,01	0,40	»	0,77	1,22	»	0,53	0,93	»	0,30	0,51	»	0,22	0,33	»	0,14	0,14	»	0,26	0,28	»
	Illégitimes	3,25	0,33	»	1,61	0,53	»	1,65	2,07	»	1,60	2.02	»	0,84	1,10	»	0,52	0,59	»	0,21	0.23	»	0,57	0,52	»
1931	Légitimes	2,47	0,36	»	0,89	0,62	»	0,64	0,33	»	0,43	0,42	»	0,21	0,27	»	0,16	0,19	»	0,12	0,11	»	0,21	0,16	»
	Illégitimes	2,97	0,70	»	1,34	0,84	»	1,06	,67	»	1,05	1,17	»	0,55	0,76	»	0,32	0,31	»	0,18	0,12	»	0,39	0,31	»
1932	Légitimes	2,45	0,30	»	0,90	0,50	»	0,62	0,35	»	0,42	0,52	»	0.20	0,30	»	0,16	0,19	»	0,11	0.10	»	0,21	0,17	»
	Illégitimes	3,75	1,48	»	1,56	0,34	»	1,39	1,24	»	1,03	0,81	»	0,50	0,50	»	0,31	0,31	»	0,15	0,14	»	0,43	0,25	»
1933	Légitimes	2,49	0,18	»	0,87	0,25	»	0,62	0,72	»	0,39	0,42	»	0,20	0,28	»	0,16	0,17	»	0,11	0,09	»	0,21	0,15	»
	Illégitimes	2,90	0,86	4,02	1.11	0,00	1,57	1,12	1,00	2,22	0,89	0,65	1,99	0,45	0,53	0,85	0,27	0,24	0,39	0,14	0,12	0,17	0,35	0,22	0,39
1934	Légitimes	2,53	»	»	0,85	»	»	0 58	»	»	0,36		»	0,20	»	»	0,15	»	»	0,10	»		0,19	»	»
	Illégitimes	3,03	»	4,78	1,15	»	1,38	0,97	»	1.38	0,81		1,31	0,46	»	0,65	0,27	»	0,30	0,15	»	0,18	0,34	»	0,33
1935	Légitimes	2,48	»	»	0,87	»	»	0,52	»	»	0,34		»	0,20	»	»	0,15	»	»	0,10	»	»	0,19	»	»
	Illégitimes	3,11	»	3,86	1,25	»	0,42	0,94	»	1,27	0,71		1,41	0,43	»	0,60	0.28	»	0,34	0,15	»	0,14	0,33	»	0,31
DIMINUTION EN %																									
(1)	Légitimes	3.9	52,7		13,9	37,6	»	32,5	41,0	»	35,8	54,8	»	33,3	45,2	»	31,8	48,5	»	28,5	35,7	»	26,9	46,5	»
	Illégitimes	4,3	+1,60	4,0	22,4	100	73,3	43,0	51,6	42,7	55,6	67,8	29,1	48,8	51,7	29,4	46,2	59,3	12,8	28,5	47,8	17,1	42.1	57,7	20,5

(2) Été chaud